

■ 投与量調整・維持

投与開始後

4週間投与

エベレンゾ錠 週3回

投与開始後・投与中の注意事項

Hb濃度の確認

Hb濃度が目標範囲に到達し、
安定するまでは
週1回～2週に1回程度、Hb濃度を確認
してください。

減量・休薬の目安

Hb濃度が4週以内に2.0g/dLを超える
ような急激な上昇を認めた場合、
減量・休薬等の
適切な処置をとってください。

投与量の調整


4週間投与 4週間投与

投与量調整

投与量調整

投与量調整

投与量調整の目安



段階	1	2	3	4	5	6	7	8
(注)	20 mg	40 mg	50 mg	70 mg	100 mg	120 mg	150 mg	200 mg

(注) 1回投与量は3.0mg/kgを超えないようご注意ください。
また、200mgを超える場合は、50mgずつ增量してください。

投与量の調整を行った場合の注意事項

調整後の用量

少なくとも
4週間は同一用量を維持してください。

減量・休薬の目安

增量後4週以内にHb濃度が急激に上昇
(2.0g/dLを超える)した場合、
速やかに減量又は休薬してください。

過量投与

- エベレンゾ錠の過量投与により、
ヘモグロビン濃度が必要以上に増加する
おそれがあります。
- エベレンゾ錠を過量投与した場合は、
エベレンゾ錠の減量・休薬等の適切な処置を行ってください。
- なお、エベレンゾは透析で除去されません。