

ツムラ医療用漢方製剤一覧

(薬価基準収載)

1 ツムラ葛根湯

カッコントウ
エキス顆粒(医療用)

[TJ-1]

【効能又は効果】
自然発汗がなく頭痛、発熱、悪寒、肩こり等を伴う比較的体力のあるものの次の諸症：
感冒、鼻かぜ、熱性疾患の初期、炎症性疾患(結膜炎、角膜炎、中耳炎、扁桃腺炎、乳腺炎、リンパ腺炎)、肩こり、上半身の神経痛、じんましん
用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

ツムラ葛根湯加川芎辛夷

エキス顆粒(医療用)

[TJ-2]

【効能又は効果】
鼻づまり、蓄膿症、慢性鼻炎
用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

3 ツムラ乙字湯

エキス顆粒(医療用)

[TJ-3]

【効能又は効果】
病状がそれほど激しくなく、体力が中位で衰弱していないものの次の諸症：キレ痔、イボ痔
用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

5 ツムラ安中散

エキス顆粒(医療用)

[TJ-5]

【効能又は効果】
やせ型で腹部筋肉が弛緩する傾向にあり、胃痛または腹痛があつて、ときに胸やけ、げっぷ、食欲不振、はきけなどを伴う次の諸症：
神経性胃炎、慢性胃炎、胃アトニー
用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

6 ツムラ十味敗毒湯

エキス顆粒(医療用)

[TJ-6]

【効能又は効果】
化膿性皮膚疾患：急性皮膚疾患の初期、じんましん、急性湿疹、水虫
用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

7 ツムラハ味地黄丸

エキス顆粒(医療用)

[TJ-7]

【効能又は効果】
疲労、倦怠感著しく、尿利減少または頻数、口渴し、手足に交差的に冷感と熱感のあるものの次の諸症：
腎炎、糖尿病、陰垂、坐骨神経痛、腰痛、脚気、膀胱カタル、前立腺肥大、高血圧
用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

8 ツムラ大柴胡湯

エキス顆粒(医療用)

[TJ-8]

【効能又は効果】
比較的体力のある人で、便秘がちで、上腹部が張って苦しく、耳鳴り、肩こりなど伴うものの次の諸症：
胆石症、胆のう炎、黄疸、肝機能障害、高血圧症、脳溢血、じんましん、胃酸過多症、急性胃腸カタル、悪心、嘔吐、食欲不振、痔疾、糖尿病、ノイローゼ、不眠症
用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

9 ツムラ小柴胡湯

エキス顆粒(医療用)

[TJ-9]

【警告】
1. 本剤の投与により、間質性肺炎が起こり、早期に適切な処置を行わない場合、死亡等の重篤な転帰に至ることがあるので、患者の状態を十分観察し、発熱、咳嗽、呼吸困難、肺音の異常(捻音音)、胸部X線異常等があらわれた場合には、ただちに本剤の投与を中止すること。
2. 発熱、咳嗽、呼吸困難等があらわれた場合には、本剤の服用を中止し、ただちに連絡するよう患者に対し注意を行うこと。
〔重大な副作用〕の項参照)

【効能又は効果】
1. 体力中等度で上腹部がはつて苦しく、舌苔を生じ、口中不快、食欲不振、時により微熱、悪心などのあるものの次の諸症：
諸種の急性熱性病、肺炎、気管支炎、気管支喘息、感冒、リンパ腺炎、慢性胃腸障害、産後回復不良
2. 慢性肝炎における肝機能障害の改善
〔禁忌〕(5ページ④参照)
用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

10 ツムラ柴胡桂枝湯

エキス顆粒(医療用)

[TJ-10]

【効能又は効果】
発熱汗出、悪寒し、身体痛み、頭痛、はきけのあるものの次の諸症：感冒・流感・肺炎・肺結核などの熱性疾患、胃潰瘍・十二指腸潰瘍・胆のう炎・胆石・肝機能障害・脾臓炎などの心下部緊張疼痛
用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

11 ツムラ柴胡桂枝乾姜湯

サイコケシカンキョウトウ
エキス顆粒(医療用)

[TJ-11]

【効能又は効果】
体力が弱く、冷え症、貧血気味で、動悸、息切れがあり、神経過敏のものの次の諸症：
更年期障害、血の道症、神經症、不眠症
用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

12 ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯

サイコカラリョウコツボレイトウ
エキス顆粒(医療用)

[TJ-12]

【効能又は効果】
比較的体力があり、心悸亢進、不眠、いらだち等の精神症状のあるものの次の諸症：高血圧症、動脈硬化症、慢性腎臓病、神経衰弱症、神經性心悸亢進症、てんかん、ビステー、小児夜啼症、陰萎
用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

14 ツムラ半夏瀉心湯

ハシゲシジントウ
エキス顆粒(医療用)

[TJ-14]

【効能又は効果】
みぞおちがつかえ、ときに悪心、嘔吐があり食欲不振で腹が鳴って軟便または下痢の傾向のあるものの次の諸症：
急・慢性胃腸カタル、醸醉性下痢、消化不良、胃下垂、神經性胃炎、胃弱、二日酔、げっぷ、胸やけ、口内炎、神經症
〔禁忌〕(5ページ④参照)
用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

15 ツムラ黄連解毒湯

オウレンゲドクトウ
エキス顆粒(医療用)

[TJ-15]

【効能又は効果】
比較的体力があり、のぼせぎみで顔色赤く、いろいろする傾向のある次の諸症：
鼻出血、高血圧、不眠症、ノイローゼ、胃炎、二日酔、血の道症、めまい、動悸、湿疹・皮膚炎、皮膚癌痒症
用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

16 ツムラ半夏厚朴湯

ハシゲココボクトウ
エキス顆粒(医療用)

[TJ-16]

【効能又は効果】
気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症：
不安神経症、神經性胃炎、つわり、せき、しづがれ声、神經性食道狭窄症、不眠症
用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

17 ツムラ五苓散

ゴレイサン
エキス顆粒(医療用)

[TJ-17]

【効能又は効果】
口渴、尿量減少するものの次の諸症：浮腫、ネフローゼ、二日酔、急性胃腸カタル、下痢、悪心、嘔吐、めまい、胃内停水、頭痛、尿毒症、暑氣あたり、糖尿病
用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

18 ツムラ桂枝加朮附湯

ケイシカジツブトウ
エキス顆粒(医療用)

[TJ-18]

【効能又は効果】
関節痛、神經痛

用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

19 ツムラ小青竜湯

ショセイリョウトウ
エキス顆粒(医療用)

[TJ-19]

【効能又は効果】
下記疾患における水様の痰、水様鼻汁、鼻閉、くしゃみ、喘鳴、咳嗽、流涙：
気管支炎、気管支喘息、鼻炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、感冒
〔禁忌〕(5ページ④参照)
用量(9.0g/日、分包品1包3.0g)

20 ツムラ防己黃耆湯

ボウイオウギトウ
エキス顆粒(医療用)

[TJ-20]

【効能又は効果】
色白で筋肉軟らかく水ぶどうの体质で疲れやすく、汗が多く、小便不利で下肢に浮腫をきたし、膝関節の腫痛するものの次の諸症：
腎炎、ネフローゼ、妊娠腎、陰囊水腫、肥満症、関節炎、瘤、瘤、筋炎、浮腫、皮膚病、多汗症、月経不順
用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

21 ツムラ小半夏加茯苓湯

ショハシブリョウトウ
エキス顆粒(医療用)

[TJ-21]

【効能又は効果】
体力中等度の次の諸症：
妊娠嘔吐(つわり)、そのほかの諸病の嘔吐(急性胃腸炎、湿性胃腸炎、水腫性脚氣、蓄膿症)
用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

22 ツムラ消風散

ショウフサン
エキス顆粒(医療用)

[TJ-22]

【効能又は効果】
分泌物が多く、かゆみの強い慢性的皮膚病(湿疹、尋麻疹、水虫、あせも、皮膚癌痒症)
用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

23 ツムラ当帰芍藥散

トウキシャクヤクサン
エキス顆粒(医療用)

[TJ-23]

【効能又は効果】
筋肉が一體に軟弱で疲れやすくなり、腰脚の冷えやすいものの次の諸症：貧血、倦怠感、更年期障害(頭重、頭痛、めまい、肩こり等)、月経不順、月経困難、不妊症、動悸、慢性腎炎、妊娠中の諸病(浮腫、習慣性流産、痔、腹痛)、脚気、半身不隨、心臓弁膜症
用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

24 ツムラ加味逍遙散

カミショウヨウサン
エキス顆粒(医療用)

[TJ-24]

【効能又は効果】
体質虚弱な婦人に肩がこり、疲れやすく、精神不安などの精神神経症状、ときに便秘の傾向のある次の諸症：冷え症、虚弱体質、月経不順、月經困難、更年期障害、血の道症
用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

25 ツムラ桂枝茯苓丸

ケイシブリョウガン
エキス顆粒(医療用)

[TJ-25]

【効能又は効果】
体格はしっかりとしていて赤ら顔が多く、腹部は大体充実、下腹部に抵抗のあるものの次の諸症：
子宮並びにその付属器の炎症、子宮内膜炎、月経不順、月經困難、帯下、更年期障害(頭痛、めまい、のぼせ、肩こり等)、冷え症、腹膜炎、打撲症、痔疾症、睾丸炎
用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

26 ツムラ桂枝加竜骨牡蠣湯

エキス顆粒(医療用)

[TJ-26]

【効能又は効果】
下腹直腹筋に緊張のある比較的体力の衰えているものの次の諸症：
小児夜尿症、神經衰弱、性的神經衰弱、遺精、陰萎
用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

27 ツムラ麻黃湯

エキス顆粒(医療用)

[TJ-27]

【効能又は効果】
悪寒、発熱、頭痛、腰痛、自然に汗の出ないものの次の諸症：感冒、インフルエンザ(初期のもの)、関節リウマチ、喘息、乳児の鼻閉塞、哺乳困難
用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

28 ツムラ越婢加朮湯

エキス顆粒(医療用)

[TJ-28]

【効能又は効果】
浮腫と汗が出て小便不利のあるものの次の諸症：
腎炎、ネフローゼ、脚気、関節リウマチ、夜尿症、湿疹
用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

29 ツムラ麦門冬湯

エキス顆粒(医療用)

[TJ-29]

【効能又は効果】
痰の切れにくい咳、気管支炎、気管支ぜんそく
用量(9.0g/日、分包品1包3.0g)

30 ツムラ真武湯

エキス顆粒(医療用)

[TJ-30]

【効能又は効果】
新陳代謝の沈衰しているものの次の諸症：
胃腸疾患、胃腸虚弱症、慢性腸炎、消化不良、胃アトニー、胃下垂症、ネフローゼ、腹膜炎、脳溢血、脊髓疾患による運動ならびに知覚障害、神經衰弱、高血圧症、心臓弁膜症、心不全で心悸亢進、半身不隨、リウマチ、老人性癌痒症
用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

31 ツムラ吳茱萸湯

エキス顆粒(医療用)

[TJ-31]

【効能又は効果】
手足の冷えやすい中等度以下の体力のものの次の諸症：
習慣性偏頭痛、習慣性頭痛、嘔吐、脚気衝心
用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

= 32 = ツムラ人參湯

エキス顆粒(医療用)

[TJ-32]

【効能又は効果】

体質虚弱の人、或いは虚弱により体力低下した人の次の諸症：急性・慢性胃腸力タル、胃アトニー症、胃拡張、悪阻(つわり)、萎縮腫

【禁忌】(5ページ⑧参照) 用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

= 33 = ツムラ大黃牡丹皮湯

エキス顆粒(医療用)

[TJ-33]

【効能又は効果】

比較的体力があり、下腹部痛があつて、便秘がちなもの次の諸症：月経不順、月経困難、便秘、痔疾

用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

= 34 = ツムラ白虎加人參湯

エキス顆粒(医療用)

[TJ-34]

【効能又は効果】

のどの渴きとほてりのあるもの

用量(9.0g／日、分包品1包3.0g)

= 35 = ツムラ四逆散

エキス顆粒(医療用)

[TJ-35]

【効能又は効果】

比較的体力のあるもので、大柴胡湯証と小柴胡湯証との中間証を表わすものの次の諸症：

胆囊炎、胆石症、胃炎、胃酸过多、胃潰瘍、鼻力タル、気管支炎、神經質、ヒステリー

用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

= 36 = ツムラ木防已湯

エキス顆粒(医療用)

[TJ-36]

【効能又は効果】

顔色がさえず、咳をともなう呼吸困難があり、心臓下部に緊張圧重感があるものの心臓、あるいは、腎臓にもとづく疾患、浮腫、心臓性喘息

用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

= 37 = ツムラ半夏白朮天麻湯

エキス顆粒(医療用)

[TJ-37]

【効能又は効果】

胃腸虚弱で下肢が冷え、めまい、頭痛などがある者

用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

= 38 = ツムラ当帰四逆加吳茱萸生姜湯

エキス顆粒(医療用)

[TJ-38]

【効能又は効果】

手足の冷えを感じ、下肢が冷えると下肢又は下腹部が痛くなり易いものの次の諸症：

しかもやけ、頭痛、下腹部痛、腰痛

用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

= 39 = ツムラ芩桂朮甘湯

エキス顆粒(医療用)

[TJ-39]

【効能又は効果】

めまい、ふらつきがあり、または動悸があり尿量が減少するものの次の諸症：

神經質、ノイローゼ、めまい、動悸、息切れ、頭痛

用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

= 40 = ツムラ猪苓湯

エキス顆粒(医療用)

[TJ-40]

【効能又は効果】

尿量減少、小便難、口渴を訴えるものの次の諸症：尿道炎、腎臓炎、腎石症、淋炎、排尿痛、血尿、腰以下の浮腫、残尿感、下痢

用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

= 41 = ツムラ補中益氣湯

エキス顆粒(医療用)

[TJ-41]

【効能又は効果】

消化機能が衰え、四肢倦怠感著しい虚弱体質者の次の諸症：

夏やせ、病後の体力増強、結核症、食欲不振、胃下垂、感冒、痔、脱肛、子宮下垂、陰萎、半身不隨、多汗症

用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

= 43 = ツムラ六君子湯

エキス顆粒(医療用)

[TJ-43]

【効能又は効果】

胃腸の弱いもので、食欲がなく、みぞおちがつかえ、疲れやすく、貧血性で手足が冷えやすいものの次の諸症：胃炎、胃アトニー、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐

用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

= 45 = ツムラ桂枝湯

ケイシトウ

エキス顆粒(医療用)

[TJ-45]

【効能又は効果】
体力が衰えたときの風邪の初期

用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

= 46 = ツムラ七物降下湯

シナモトコウカトウ

エキス顆粒(医療用)

[TJ-46]

【効能又は効果】
身体虚弱の傾向のあるものの次の諸症：
高血圧に伴う随伴症状(のぼせ、肩こり、耳鳴り、頭重)

用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

= 47 = ツムラ釣藤散

チヨウトクサン

エキス顆粒(医療用)

[TJ-47]

【効能又は効果】
慢性に続く頭痛で中年以降、または高血圧の傾向のあるもの

用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

= 48 = ツムラ十全大補湯

ジウゼンタイホトウ

エキス顆粒(医療用)

[TJ-48]

【効能又は効果】
病後の体力低下、疲労倦怠、食欲不振、ねあせ、手足の冷え、貧血

用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

= 50 = ツムラ荊芥連翹湯

ケイガイレンキウトウ

エキス顆粒(医療用)

[TJ-50]

【効能又は効果】
蓄膿症、慢性鼻炎、慢性扁桃炎、にきび

用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

= 51 = ツムラ潤腸湯

ジョンチクトウ

エキス顆粒(医療用)

[TJ-51]

【効能又は効果】
便秘

用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

= 52 = ツムラ薏苡仁湯

ジヨイニントウ

エキス顆粒(医療用)

[TJ-52]

【効能又は効果】
関節痛、筋肉痛

用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

= 53 = ツムラ疎經活血湯

ジケイカンケツトウ

エキス顆粒(医療用)

[TJ-53]

【効能又は効果】
関節痛、神經痛、腰痛、筋肉痛

用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

= 54 = ツムラ抑肝散

ヨクカンサン

エキス顆粒(医療用)

[TJ-54]

【効能又は効果】
虚弱な体質で神經がたかぶるものの次の諸症：
神經症、不眠症、小児夜なき、小児疳症

用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

= 55 = ツムラ麻杏甘石湯

マキョウカンセキトウ

エキス顆粒(医療用)

[TJ-55]

【効能又は効果】
小児ぜんそく、気管支ぜんそく

用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

= 56 = ツムラ五淋散

ゴリンサン

エキス顆粒(医療用)

[TJ-56]

【効能又は効果】
頻尿、排尿痛、残尿感

用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

= 57 = ツムラ温清飲

ワセイイン

エキス顆粒(医療用)

[TJ-57]

【効能又は効果】
皮膚の色つやが悪く、のぼせるものに用いる：
月経不順、月経困難、血の道症、更年期障害、神經症

用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

= 58 = ツムラ清上防風湯

セイショウボウフクトウ

エキス顆粒(医療用)

[TJ-58]

【効能又は効果】
にきび

用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

= 59 = ツムラ治頭瘡一方

チツソウイツボウ

エキス顆粒(医療用)

[TJ-59]

【効能又は効果】
湿疹、くさ、乳幼児の湿疹
用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

= 60 = ツムラ桂枝加芍藥湯

ケイシカシャクヤクトウ

エキス顆粒(医療用)

[TJ-60]

【効能又は効果】
腹部膨満感のある次の諸症：しぶり腹、腹痛
用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

= 61 = ツムラ桃核承氣湯

トウカクジョウキトウ

エキス顆粒(医療用)

[TJ-61]

【効能又は効果】
比較的体力があり、のぼせて便秘がちなの次の諸症：
月経不順、月経困難症、月経時や産後の精神不安、腰痛、便秘、高血圧の随伴症状(頭痛、めまい、肩こり)
用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

= 62 = ツムラ防風通聖散

ボウフウツウショウサン

エキス顆粒(医療用)

[TJ-62]

【効能又は効果】
腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなの次の諸症：
高血圧の随伴症状(どうき、肩こり、のぼせ)、肥満症、むくみ、便秘
用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

= 63 = ツムラ五積散

ゴシャクサン

エキス顆粒(医療用)

[TJ-63]

【効能又は効果】
慢性に経過し、症状の激しくない次の諸症：
胃腸炎、腰痛、神經痛、関節痛、月経痛、頭痛、冷え症、更年期障害、感冒
用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

= 64 = ツムラ炙甘草湯

シャカンゾウトウ

エキス顆粒(医療用)

[TJ-64]

【効能又は効果】
体力がおとろえて、疲れやすいものの動悸、息切れ
【禁忌】(5ページ⑧参照) 用量(9.0g／日、分包品1包3.0g)

= 65 = ツムラ帰脾湯

キビトウ

エキス顆粒(医療用)

[TJ-65]

【効能又は効果】
虚弱体質で血色の悪い人の次の諸症：貧血、不眠症
用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

= 66 = ツムラ参蘇飲

ジンソイン

エキス顆粒(医療用)

[TJ-66]

【効能又は効果】
感冒、せき
用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

= 67 = ツムラ女神散

ニヨシンサン

エキス顆粒(医療用)

[TJ-67]

【効能又は効果】
のぼせとめいのあるものの次の諸症：
産前産後の神經症、月経不順、血の道症
用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

= 68 = ツムラ芍藥甘草湯

シャクカンゾウトウ

エキス顆粒(医療用)

[TJ-68]

【効能又は効果】
急激におこる筋肉のけいれんを伴う疼痛、筋肉・関節痛、胃痛、腹痛
【禁忌】(5ページ⑧参照) 用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

= 69 = ツムラ茯苓飲

ブリョウイン

エキス顆粒(医療用)

[TJ-69]

【効能又は効果】
吐き気や胸やけがあり尿量が減少するものの次の諸症：
胃炎、胃アトニー、溜飲
用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

= 70 = ツムラ香蘇散

コウソサン

エキス顆粒(医療用)

[TJ-70]

【効能又は効果】
胃腸虚弱で神經質の人の風邪の初期
用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

71 ツムラ四物湯

エキス顆粒(医療用)

[TJ-71]

【効能又は効果】

皮膚が枯燥し、色つやの悪い体質で胃腸障害のない人の次の諸症：産後あるいは流産後の疲労回復、月経不順、冷え症、しみやけ、しみ、血の道症

用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

72 ツムラ甘麦大棗湯

エキス顆粒(医療用)

[TJ-72]

【効能又は効果】

夜泣き、ひきつけ

【禁忌】(5ページ⑧参照) 用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

73 ツムラ柴陷湯

エキス顆粒(医療用)

[TJ-73]

【効能又は効果】

咳、咳による胸痛

用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

74 ツムラ調胃承気湯

エキス顆粒(医療用)

[TJ-74]

【効能又は効果】

便秘

用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

75 ツムラ四君子湯

エキス顆粒(医療用)

[TJ-75]

【効能又は効果】

やせて顔色が悪くて、食欲がなく、つかれやすいものの次の諸症：胃腸虚弱、慢性胃炎、胃のもたれ、嘔吐、下痢

用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

76 ツムラ竜胆瀉肝湯

エキス顆粒(医療用)

[TJ-76]

【効能又は効果】

比較的体力があり、下腹部筋肉が緊張する傾向があるものの次の諸症：排尿痛、残尿感、尿の濁り、こしけ

用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

77 ツムラ芎帰膠艾湯

エキス顆粒(医療用)

[TJ-77]

【効能又は効果】

痔出血

【禁忌】(5ページ⑧参照) 用量(9.0g／日、分包品1包3.0g)

78 ツムラ麻杏薏甘湯

エキス顆粒(医療用)

[TJ-78]

【効能又は効果】

関節痛、神経痛、筋肉痛

用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

79 ツムラ平胃散

エキス顆粒(医療用)

[TJ-79]

【効能又は効果】

胃がもたれて消化不良の傾向のある次の諸症：
急・慢性胃カタル、胃アトニー、消化不良、食欲不振

用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

80 ツムラ柴胡清肝湯

エキス顆粒(医療用)

[TJ-80]

【効能又は効果】

かんの強い傾向のある小児の次の諸症：
神経症、慢性扁桃腺炎、湿疹

用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

81 ツムラ二陳湯

エキス顆粒(医療用)

[TJ-81]

【効能又は効果】

悪心、嘔吐

用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

82 ツムラ桂枝人参湯

エキス顆粒(医療用)

[TJ-82]

【効能又は効果】

胃腸の弱い人の次の諸症：
頭痛、動悸、慢性胃腸炎、胃アトニー

【禁忌】(5ページ⑧参照) 用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

83 ツムラ抑肝散加陳皮半夏

エキス顆粒(医療用)

[TJ-83]

【効能又は効果】

虚弱な体質で神経がたかぶるもの次の諸症：
神経症、不眠症、小児夜なき、小児疳症

用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

84 ツムラ大黃甘草湯

エキス顆粒(医療用)

[TJ-84]

【効能又は効果】

便秘症

用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

85 ツムラ神秘湯

エキス顆粒(医療用)

[TJ-85]

【効能又は効果】

小児ぜんそく、気管支ぜんそく、気管支炎

用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

86 ツムラ当帰飲子

エキス顆粒(医療用)

[TJ-86]

【効能又は効果】

冷え症のものの次の諸症：

慢性湿疹(分泌物の少ないもの)、かゆみ

用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

87 ツムラ六味丸

エキス顆粒(医療用)

[TJ-87]

【効能又は効果】

疲れやすくて尿量減少または多尿で、時に口渴がある

ものの次の諸症：排尿困難、頻尿、むくみ、かゆみ

用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

88 ツムラニニ朧湯

エキス顆粒(医療用)

[TJ-88]

【効能又は効果】

五十肩

用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

89 ツムラ治打撲一方

エキス顆粒(医療用)

[TJ-89]

【効能又は効果】

打撲によるはれ及び痛み

用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

90 ツムラ清肺湯

エキス顆粒(医療用)

[TJ-90]

【効能又は効果】

痰の多く出る咳

用量(9.0g／日、分包品1包3.0g)

91 ツムラ竹筍温胆湯

エキス顆粒(医療用)

[TJ-91]

【効能又は効果】

インフルエンザ、風邪、肺炎などの回復期に熱が長びいたり、また平熱になんでも、気分がさっぱりせず、せきや痰が多くて安眠が出来ないもの

用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

92 ツムラ滋陰至宝湯

エキス顆粒(医療用)

[TJ-92]

【効能又は効果】

虚弱などの慢性のせき・たん

用量(9.0g／日、分包品1包3.0g)

93 ツムラ滋陰降火湯

エキス顆粒(医療用)

[TJ-93]

【効能又は効果】

のどにうるおいがなく痰の出なくて咳こむもの

用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

95 ツムラ五虎湯

エキス顆粒(医療用)

[TJ-95]

【効能又は効果】

せき、気管支ぜんそく

用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

96 ツムラ柴朴湯

エキス顆粒(医療用)

[TJ-96]

【効能又は効果】

気分がふさいで、喉鳴、食道部に異物感があり、時に

動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症：

小児ぜんそく、気管支ぜんそく、気管支炎、せき、

不安神経症

用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

97 ツムラ大防風湯

エキス顆粒(医療用)

[TJ-97]

【効能又は効果】

関節がはれて痛み、痺痺、強直して屈伸しがたいものの次の諸症：

下肢の関節リウマチ、慢性関節炎、痛風

用量(10.5g／日、分包品1包3.5g)

98 ツムラ黄耆建中湯

エキス顆粒(医療用)

[TJ-98]

【効能又は効果】

身体虚弱で疲労しやすいものの次の諸症：

虚弱体質、病後の衰弱、ねあせ

用量(18.0g／日、分包品2包(1包3.0g))

99 ツムラ小建中湯

エキス顆粒(医療用)

[TJ-99]

【効能又は効果】

体質虚弱で疲労しやすく、血色がすぐれず、腹痛、動悸、手足のほてり、冷え、頻尿および多尿などのいずれかを伴う次の諸症：

小児虚弱体質、疲労倦怠、神経質、慢性胃腸炎、小児夜尿症、夜なき

用量(15.0g／日、分包品2包(1包2.5g))

100 ツムラ大建中湯

エキス顆粒(医療用)

[TJ-100]

【効能又は効果】

腹が冷えて痛み、腹部膨満感のあるもの

用量(15.0g／日、分包品2包(1包2.5g))

101 ツムラ升麻葛根湯

エキス顆粒(医療用)

[TJ-101]

【効能又は効果】

感冒の初期、皮膚炎

用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

102 ツムラ当帰湯

エキス顆粒(医療用)

[TJ-102]

【効能又は効果】

背中に寒冷を覚え、腹部膨満感や腹痛のあるもの

用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

103 ツムラ酸棗仁湯

エキス顆粒(医療用)

[TJ-103]

【効能又は効果】

心身がつかれ弱って眠れないもの

用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

104 ツムラ辛夷清肺湯

エキス顆粒(医療用)

[TJ-104]

【効能又は効果】

鼻づまり、慢性鼻炎、蓄膿症

用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

105 ツムラ通導散

エキス顆粒(医療用)

[TJ-105]

【効能又は効果】

比較的体力があり下腹部に圧痛があって便秘しがちなものの次の諸症：

月経不順、月経痛、更年期障害、腰痛、便秘、打ち身(打撲)、高血圧の随伴症状(頭痛、めまい、肩こり)

用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

106 ツムラ温経湯

エキス顆粒(医療用)

[TJ-106]

【効能又は効果】

手足がほてり、唇がかわくものの次の諸症：

月経不順、月経困難、こしけ、更年期障害、不眠、神経症、湿疹、足腰の冷え、しみやけ

用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

107 ツムラ牛車腎氣丸

エキス顆粒(医療用)

[TJ-107]

【効能又は効果】

疲れやすく、四肢が冷えやすく尿量減少または多尿で時に口渴がある次の諸症：下肢痛、腰痛、しびれ、老人のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ

用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

108 ツムラ人參養榮湯

エキス顆粒(医療用)

[TJ-108]

【効能又は効果】

病後の体力低下、疲労倦怠、食欲不振、ねあせ、手足の冷え、貧血

用量(9.0g／日、分包品1包3.0g)

109 ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏 エキス顆粒(医療用) [TJ-109]

【効能又は効果】
咽喉がはれて痛む次の諸症：扁桃炎、扁桃周囲炎
【用量】(7.5g／日、分包品1包2.5g)

110 ツムラ立効散 エキス顆粒(医療用) [TJ-110]

【効能又は効果】
抜歯後の疼痛、歯痛
【用量】(7.5g／日、分包品1包2.5g)

111 ツムラ清心蓮子飲 エキス顆粒(医療用) [TJ-111]

【効能又は効果】
全身倦怠感があり、口や舌が乾き、尿が出しづらるもの
の次の諸症：残尿感、頻尿、排尿痛
【用量】(7.5g／日、分包品1包2.5g)

112 ツムラ猪苓湯合四物湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-112]

【効能又は効果】
皮膚が枯燥し、色つやの悪い体质で胃腸障害のない人の
次の諸症：
・高血圧の随伴症状(のぼせ、肩こり、耳鳴り、頭重、不眠、不安)、鼻血、痔出、便秘、更年期障害、血の道症
【用量】(7.5g／日、分包品1包2.5g)

113 ツムラ三黄瀉心湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-113]

【効能又は効果】
比較的体力があり、のぼせ気味で、顔面紅潮し、精神不安で、便秘の傾向のあるものの次の諸症：
・高血圧の随伴症状(のぼせ、肩こり、耳鳴り、頭重、不眠、不安)、鼻血、痔出、便秘、更年期障害、血の道症
【用量】(7.5g／日、分包品1包2.5g)

114 ツムラ柴苓湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-114]

【効能又は効果】
吐き気、食欲不振、のどのかわき、排尿が少ないなどの
次の諸症：
・水瀉性下痢、急性胃腸炎、暑氣あたり、むくみ
【用量】(9.0g／日、分包品1包3.0g)

115 ツムラ胃苓湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-115]

【効能又は効果】
水瀉性の下痢、嘔吐があり、口渴、尿量減少を伴う次の諸症：
・食あたり、暑氣あたり、冷え腹、急性胃腸炎、腹痛
【用量】(7.5g／日、分包品1包2.5g)

116 ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-116]

【効能又は効果】
気分がひさいで、咽喉、食道部に異物感があり、時に
動悸、めまい、嘔気、胸やけなどがあり、尿量の減少する
ものの次の諸症：
・不安神経症、神経性胃炎、つわり、溜飲、胃炎
【用量】(7.5g／日、分包品1包2.5g)

117 ツムラ茵陳五苓散 エキス顆粒(医療用) [TJ-117]

【効能又は効果】
のどが渇いて、尿が少ないものの次の諸症：
・嘔吐、じんましん、二日酔のむかつき、むくみ
【用量】(7.5g／日、分包品1包2.5g)

118 ツムラ苓姜朮甘湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-118]

【効能又は効果】
腰に冷えと痛みがあつて、尿量が多い次の諸症：
・腰痛、腰の冷え、夜尿症
【用量】(7.5g／日、分包品1包2.5g)

119 ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-119]

【効能又は効果】
貧血、冷え症で喘鳴を伴う咳痰の多い咳嗽があるもの。
・気管支炎、気管支喘息、心臓衰弱、腎臓病
【用量】(7.5g／日、分包品1包2.5g)

120 ツムラ黃連湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-120]

【効能又は効果】
胃部の停滞感や重圧感、食欲不振のあるものの次の諸症：
・急性胃炎、二日酔、口内炎
【禁忌】(5ページ⑧参照) 【用量】(7.5g／日、分包品1包2.5g)

121 ツムラ三物黃芩湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-121]

【効能又は効果】
手足のほてり
【用量】(7.5g／日、分包品1包2.5g)

122 ツムラ排膿散及湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-122]

【効能又は効果】
患部が発赤、腫脹して疼痛をともなった化膿症、瘍、癰、面疔、その他癌腫症
【禁忌】(5ページ⑧参照) 【用量】(7.5g／日、分包品1包2.5g)

123 ツムラ当帰建中湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-123]

【効能又は効果】
疲労しやすく、血色のすぐれないものの次の諸症：
・月経痛、下腹部痛、痔、脱肛の痛み
【用量】(7.5g／日、分包品1包2.5g)

124 ツムラ川芎茶調散 エキス顆粒(医療用) [TJ-124]

【効能又は効果】
かぜ、血の道症、頭痛
【用量】(7.5g／日、分包品1包2.5g)

125 ツムラ桂枝茯苓丸加薏苡仁 エキス顆粒(医療用) [TJ-125]

【効能又は効果】
比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症：
・月経不順、血の道症、にきび、しみ、手足のあれ
【用量】(7.5g／日、分包品1包2.5g)

126 ツムラ麻子仁丸 エキス顆粒(医療用) [TJ-126]

【効能又は効果】
便秘
【用量】(7.5g／日、分包品1包2.5g)

127 ツムラ麻黃附子細辛湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-127]

【効能又は効果】
悪寒、微熱、全身倦怠、低血圧で頭痛、めまいあり、四肢に疼痛冷感あるものの次の諸症：感冒、気管支炎
【用量】(7.5g／日、分包品1包2.5g)

128 ツムラ啓脾湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-128]

【効能又は効果】
やせて、顔色が悪く、食欲がなく、下痢の傾向がある
ものの次の諸症：
・胃腸虚弱、慢性胃腸炎、消化不良、下痢
【用量】(7.5g／日、分包品1包2.5g)

133 ツムラ大承気湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-133]

【効能又は効果】
腹部がかたくつかえて、便秘するもの、あるいは肥満
体質で便秘するもの。
・常習便秘、急性便秘、高血圧、神経症、食当り
【用量】(7.5g／日、分包品1包2.5g)

134 ツムラ桂枝加芍藥大黃湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-134]

【効能又は効果】
比較的体力のない人で、腹部膨満し、腸内の停滞感ある
いは腹痛などを伴なうものの次の諸症：
1. 急性腸炎、大腸カタル
2. 常習便秘、宿便、しづり腹
【用量】(7.5g／日、分包品1包2.5g)

135 ツムラ茵陳蒿湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-135]

【効能又は効果】
尿量減少、やゝ便秘がちで比較的体力のあるものの次の
諸症：
・黄疸、肝硬変症、ネフローゼ、じんましん、口内炎
【用量】(7.5g／日、分包品1包2.5g)

136 ツムラ清暑益氣湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-136]

【効能又は効果】
暑氣あたり、暑さによる食欲不振・下痢・全身倦怠、夏やせ
【用量】(7.5g／日、分包品1包2.5g)

137 ツムラ加味帰脾湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-137]

【効能又は効果】
虚弱体质で血色の悪い人の次の諸症：
・貧血、不眠症、精神不安、神経症
【用量】(7.5g／日、分包品1包2.5g)

138 ツムラ桔梗湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-138]

【効能又は効果】
喉嚨がはれて痛む次の諸症：扁桃炎、扁桃周囲炎
【禁忌】(5ページ⑧参照) 【用量】(7.5g／日、分包品1包2.5g)

501 ツムラ紫雲膏 [TJ-501]

【効能又は効果】
火傷、痔核による疼痛、肛門裂傷
【用法及び用量】
外用
患部を清潔にしたのち、1日数回適量を直接患部に塗布、あるいはガーゼにのばして貼付する。
【禁忌】(5ページ⑧参照)

3020 ツムラの生薬コウジン末(調剤用) [TJ-3020]

【効能又は効果】【用法及び用量】
漢方処方の調剤に用いる。

3023 日本薬局方ジン末 ブン末(調剤用)[ツムラ] [TJ-3023]

【効能又は効果】【用法及び用量】
漢方処方の調剤に用いる。

【用法及び用量】
通常、成人1日7.5gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。
なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。
該当製品 下記以外の処方 115品目
■分包品 1包あたりのg数：2.5g

2.5g

●次の品目については、用法及び用量が異なる。
通常、成人1日9.0gを2～3回に分割
該当製品(番号)
TJ-19、29、34、64、77、90、92、108、114
9品目
■分包品 1包あたりのg数：3.0g

3.0g

通常、成人1日18.0gを2～3回に分割
該当製品
TJ-98 ツムラ黄耆建中湯
■分包品 1包あたりのg数：3.0g

3.0g

通常、成人1日10.5gを2～3回に分割
該当製品
TJ-97 ツムラ大防風湯
■分包品 1包あたりのg数：3.5g

3.5g

通常、成人1日15.0gを2～3回に分割
該当製品
TJ-99 ツムラ小建中湯
TJ-100 ツムラ大建中湯
■分包品 1包あたりのg数：2.5g

2.5g

*組成、用法及び用量、「警告・禁忌を含む使用上の注意」等は製品添付文書をご覧下さい。5～6ページには「警告」、「禁忌」、「相互作用」、「副作用(重大な副作用、その他の副作用)」を一覧表にして掲載しております。

ツムラ医療用漢方製剤 五十音順索引

あ [5] 安中散	〔〕 [125] 桂枝茯苓丸加薏苡仁	し [64] 素甘草湯	た [97] 大防風湯	う [34] ピンク虎加入參湯
い [116] 青苔湯	〔〕 [128] 啓脾湯	〔〕 [68] 菖蒲甘草湯	〔〕 [91] 茶茹温胆湯	〔〕 [69] 茶茹飲
〔〕 [135] 胃陳高湯	〔〕 [130] コウジン末	〔〕 [48] 十全大補湯	〔〕 [89] 治瘉一方	〔〕 [116] 茶茹飲合半夏厚朴湯
〔〕 [117] 茵陳五苓散	〔〕 [70] 香蘇散	〔〕 [6] 十味敗毒湯	〔〕 [59] 治頭瘡一方	〔〕 [102] ブシ末
〔〕 [106] 温經湯	〔〕 [95] 五虎湯	〔〕 [51] 潤陽湯	〔〕 [74] 調胃承氣湯	〔〕 [79] 平胃散
〔〕 [57] 溫清飲	〔〕 [63] 五積散	〔〕 [99] 小建中湯	〔〕 [47] 鈎藤散	〔〕 [20] 防已黃耆湯
え [28] 越婢加木湯	〔〕 [107] 牛車腎氣丸	〔〕 [9] 小柴胡湯	〔〕 [40] 猪苓湯	〔〕 [62] 防風通聖散
お [98] 黃耆建中湯	〔〕 [31] 吳茱萸湯	〔〕 [109] 小柴胡湯加桔梗石膏	〔〕 [112] 猪苓場合四物湯	〔〕 [41] 補中益氣湯
〔〕 [15] 黃連解毒湯	〔〕 [56] 五淋散	〔〕 [19] 小青竜湯	〔〕 [105] 通導散	ま [27] 麻黃湯
〔〕 [120] 黃連湯	〔〕 [17] 五金散	〔〕 [21] 小半夏加茯苓湯	〔〕 [61] 桃核承氣湯	〔〕 [12] 麻黃附子細辛湯
〔〕 [3] 乙子湯	〔〕 [73] 柴陷湯	〔〕 [22] 消風散	〔〕 [86] 當帰飲子	〔〕 [55] 麻杏古石湯
か [1] 葛根湯	〔〕 [12] 葛根加桂骨牡蠣湯	〔〕 [101] 升麻葛根湯	〔〕 [123] 當帰建中湯	〔〕 [78] 麻杏意甘湯
〔〕 [2] 葛根加川芎辛夷	〔〕 [11] 桂枝桂枝乾姜湯	〔〕 [104] 辛夷清肺湯	〔〕 [38] 當帰四逆加吳茱萸生姜湯	〔〕 [126] 麻子仁丸
〔〕 [137] 加味帰脾湯	〔〕 [10] 桂枝桂枝湯	〔〕 [66] 參蘇飲	〔〕 [23] 當帰芍藥散	〔〕 [36] 木防己湯
〔〕 [24] 加味逍遙散	〔〕 [80] 桂枝清肝湯	〔〕 [85] 神祕湯	〔〕 [102] 當帰湯	や [52] ヨクイニシトウ
〔〕 [72] 麦甘大棗湯	〔〕 [96] 桂朴湯	〔〕 [30] 真武湯	〔〕 [88] ニホントウ	〔〕 [54] 抑肝散
き [138] 桔梗湯	〔〕 [114] 桂苓湯	〔〕 [58] 清上防風湯	〔〕 [81] ニ陳湯	〔〕 [83] 抑肝散加陳皮半夏
〔〕 [65] 帰脾湯	〔〕 [113] 三黃瀉心湯	〔〕 [136] 清暑益氣湯	〔〕 [67] 女神散	〔〕 [43] 六君子湯
〔〕 [77] 菴帰漏脲文湯	〔〕 [103] 酸棗仁湯	〔〕 [111] 清心蓮子飲	〔〕 [32] 入參湯	〔〕 [110] 立効散
け [50] 荆芥連翹湯	〔〕 [121] 三物貢芩湯	〔〕 [90] 清肺湯	〔〕 [108] 入參養榮湯	〔〕 [76] 電胞漏肝湯
〔〕 [134] 桂枝加芍藥大黃湯	〔〕 [193] 滋陰降火湯	〔〕 [124] 川芎茶調散	〔〕 [122] 排膿散及湯	〔〕 [119] 令甘姜味辛平夏湯
〔〕 [60] 桂枝加芍藥湯	〔〕 [92] 滋陰至玉湯	〔〕 [53] 疎經活血湯	〔〕 [29] 門冬湯	〔〕 [118] 令甘姜味辛平日湯
〔〕 [18] 桂枝加附子湯	〔〕 [501] 紫雲膏	〔〕 [84] 大黃草湯	〔〕 [7] 八味地黃丸	〔〕 [39] 令桂朮甘湯
〔〕 [26] 桂枝加電骨牡蠣湯	〔〕 [35] 四逆散	〔〕 [33] 大黃牡丹皮湯	〔〕 [100] 大建中湯	〔〕 [87] ロクミガン
〔〕 [45] 桂枝湯	〔〕 [75] 四君子湯	〔〕 [8] 大柴胡湯	〔〕 [14] 半夏瀉心湯	六味丸
〔〕 [82] 桂枝入參湯	〔〕 [46] 七物降下湯	〔〕 [133] 大承氣湯	〔〕 [37] 半夏白朮天麻湯	
〔〕 [25] 桂枝茯苓丸	〔〕 [71] 四物湯			

ツムラ医療用漢方製剤「警告」、「禁忌」、相互作用、副作用(重大な副作用、その他の副作用)一覧

■慎重投与、重要な基本的注意、高齢者への投与、妊娠・産婦、授乳婦への投与、小児等への投与他については製品添付文書をご覧下さい。
(※本表は各製品添付文書の「使用上の注意」等を一覧表としてまとめたものです。詳細は添付文書をご確認下さい。)

警告	【警告】		併用禁忌(併用しないこと)	
	1. 本剤の投与により、間質性肺炎が起こり、早期に適切な処置を行わない場合、死亡等の重篤な転帰に至ることがあるので、患者の状態を十分観察し、発熱、咳嗽、呼吸困難、肺音の異常(捻髪音)、胸部X線異常等があらわれた場合には、ただちに本剤の投与を中止すること。 2. 発熱、咳嗽、呼吸困難等があらわれた場合には、本剤の服用を中止し、ただちに連絡するよう患者に対し注意を行うこと。(「重大な副作用」の項参照)			
該当製品:TJ-9[ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)]		【禁忌(次の患者には投与しないこと)】		
禁忌	Ⓐ 1. インターフェロン製剤を投与中の患者(「相互作用」の項参照) 2. 肝硬変、肝癌の患者(間質性肺炎が起こり、死亡等の重篤な転帰に至ることがある。) 3. 慢性肝炎における肝機能障害で血小板数が10万/mm ³ 以下の患者[肝硬変が疑われる。]		相互作用	
	該当製品:TJ-9[ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)]			
	【禁忌(次の患者には投与しないこと)】		機序・危険因子	
	Ⓑ 1. アルドステロン症の患者 2. ミオパチーのある患者 3. 低カリウム血症のある患者 [1~3:これらの疾患及び症状が悪化するおそれがある。]			
相互作用	(1日量としてカンゾウを2.5g以上含有する品目)		機序は不明	
	該当製品: TJ-14[ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)] TJ-19[ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)] TJ-32[ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)] TJ-56[ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用)] TJ-64[ツムラ炙甘草湯エキス顆粒(医療用)] TJ-68[ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)] TJ-72[ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)] TJ-77[ツムラ芎帰漏脲文湯エキス顆粒(医療用)] TJ-82[ツムラ桂枝入參湯エキス顆粒(医療用)] TJ-120[ツムラ黄連湯エキス顆粒(医療用)] TJ-122[ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)] TJ-138[ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)]			
	【禁忌(次の患者には使用しないこと)】		該当製品: TJ-9[ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)]	
	Ⓒ 1. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 2. 重度(重症)の熱傷・外傷のある患者 3. 化膿性の創傷で高熱のある患者 4. 患部の湿潤やただれのひどい患者 [2~4:これらの症状が悪化するおそれがある。]			
該当製品:TJ-501[ツムラ紫雲膏]		薬剤名等		
併用注意(併用に注意すること)		臨床症状・措置方法		
相互作用	薬剤名等		間質性肺炎があらわれることがある。 (「重大な副作用」の項参照)	
	〔〕 (1)マオウ含有製剤 (2)エフェドリン類含有製剤 (3)モノアシ化酵素(MAO)阻害剤 (4)甲状腺製剤 チロキシン、リオチロニン (5)カテコールアミン製剤 アドレナリン、イソアドレナリン (6)キサンチン系製剤 テオブリフィン、ジプロロフィン			
	〔〕 (1)カンゾウ含有製剤 (2)グリチルリチン酸及びその塩類を含む有する製剤 (3)ループ系利尿剤 フロセミド、エタクリン酸 (4)チアジド系利尿剤 トリクロロメチアジド		機序は不明	
	(1)カンゾウ含有製剤 (2)グリチルリチン酸及びその塩類を含む有する製剤 (3)ループ系利尿剤 フロセミド、エタクリン酸 (4)チアジド系利尿剤 トリクロロメチアジド			
	〔〕 (1)カンゾウ含有製剤 (2)グリチルリチン酸及びその塩類を含む有する製剤		該当製品番号	
	(1)マオウ含有製剤 (2)エフェドリン類含有製剤 (3)モノアシ化酵素(MAO)阻害剤 (4)甲状腺製剤 チロキシン、リオチロニン (5)カテコールアミン製剤 アドレナリン、イソアドレナリン (6)キサンチン系製剤 テオブリフィン、ジプロロフィン		TJ-1、2、19、27、28、52、55、62、63、78、85、95、127	
	〔〕 (1)カンゾウ含有製剤 (2)グリチルリチン酸及びその塩類を含む有する製剤 (3)ループ系利尿剤 フロセミド、エタクリン酸 (4)チアジド系利尿剤 トリクロロメチアジド		TJ-9、14、19、32、38、56、64、68、72、77、82、120、122、138	
	(1)カンゾウ含有製剤 (2)グリチルリチン酸及びその塩類を含む有する製剤 (3)ループ系利尿剤 フロセミド、エタクリン酸 (4)チアジド系利尿剤 トリクロロメチアジド			
	(1)カンゾウ含有製剤 (2)グリチルリチン酸及びその塩類を含む有する製剤		TJ-1、2、3、5、6、10、11、18、20、22、24、26、27、28、29、34、35、39、41、43、45、47、48、50、51、52、53、54、55、58、59、60、61、62、63、65、66、67、70、73、74、75、76、78、79、80、81、83、84、85、86、88、90、91、92、93、95、96、97、98、99、101、102、103、105、106、108、109、110、111、114、115、118、119、123、124、128、134、136、137	

項目名	副作用	該当製品番号
重大な副作用	間質性肺炎 発熱、咳嗽、呼吸困難、肺音の異常(捻髪音)等があらわれた場合には、本剤の投与を中止し、速やかに胸部X線等の検査を実施するとともに副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。 また、発熱、咳嗽、呼吸困難等があらわれた場合には、本剤の服用を中止し、ただちに連絡するよう患者に対し注意を行うこと。	TJ-3、8、9、10、11、12、14、15、19、20、29、41、51、62、90、96、104、107、111、114、121
	発熱、咳嗽、呼吸困難、肺音の異常等があらわれた場合には、本剤の投与を中止し、速やかに胸部X線、胸部CT等の検査を実施するとともに副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。	TJ-50、54、56、57、88、113
	咳嗽、呼吸困難、発熱、肺音の異常等があらわれた場合には、本剤の投与を中止し、速やかに胸部X線、胸部CT等の検査を実施するとともに副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。	TJ-68、76、100、109
	偽アルドステロン症 低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム・体液の貯留、浮腫、体重増加等の偽アルドステロン症があらわれることがあるので、観察(血清カリウム値の測定等)を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。	TJ-1、2、3、5、6、9、10、11、14、18、19、20、22、24、26、27、28、29、32、34、35、38、39、41、43、45、47、48、50、51、52、53、54、55、56、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、70、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、88、89、90、91、92、93、95、96、97、98、99、101、102、103、105、106、108、109、110、111、114、115、116、118、119、120、122、123、124、128、134、136、137、138
	うつ血性心不全、心室細動、心室頻拍 (Torsades de Pointesを含む) うつ血性心不全、心室細動、心室頻拍(Torsades de Pointesを含む)があらわれることがあるので、観察(血清カリウム値の測定等)を十分に行い、動悸、息切れ、倦怠感、めまい、失神等の異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。	TJ-68
	心不全 心不全があらわれることがあるので、観察を十分に行い、体液貯留、急激な体重増加、心不全症状・徵候(息切れ、心胸比拡大、胸水等)が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。	TJ-54
	ミオパチー ¹⁾ 低カリウム血症の結果として、ミオパチー、横紋筋融解症があらわれることがあるので、脱力感、筋力低下、筋肉痛、四肢痙攣・麻痺、CK(CPK)上昇、血中及び尿中のミオグロビン上昇が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。	TJ-9、68
	ミオパチー、 横紋筋融解症 低カリウム血症の結果として、ミオパチー、横紋筋融解症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、脱力感、四肢痙攣・麻痺等の異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。	TJ-1、2、3、5、6、10、11、14、18、19、20、22、24、26、27、28、29、32、34、35、38、39、41、43、45、47、48、50、51、52、53、55、56、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、70、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、88、89、90、91、92、93、95、96、97、98、99、101、102、103、105、106、108、109、110、111、114、115、116、118、119、120、122、123、124、128、134、136、137、138
	劇症肝炎、 肝機能障害、黄疸 劇症肝炎、AST(GOT)、ALT(GPT)、Al-P、γ-GTP等の著しい上昇を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。	TJ-54
	肝機能障害、黄疸 AST(GOT)、ALT(GPT)、Al-P、γ-GTPの著しい上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。	TJ-114
	肝機能障害、黄疸 AST(GOT)、ALT(GPT)、Al-P、γ-GTPの上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。	TJ-3、9、15、62、96、104、111
	肝機能障害、黄疸 AST(GOT)、ALT(GPT)、Al-P、γ-GTP等の著しい上昇を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。	TJ-1、8、10、12、14、19、20、25、29、41、48、50、51、57、58、68、88、100、107、108、109、127、135
	腸間膜静脈硬化症 長期投与により、腸間膜静脈硬化症があらわれることがある。腹痛、下痢、便秘、腹部膨満感等が繰り返しあらわれた場合、又は便潜血陽性になつた場合には投与を中止し、CT、大腸内視鏡等の検査を実施するとともに、適切な処置を行うこと。なお、腸管切除術に至った症例も報告されている。	TJ-11、24、54、67、76、90、113、121
	腸間膜静脈硬化症 AST、ALT、Al-P、γ-GTP等の著しい上昇を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。	TJ-43
	腸間膜静脈硬化症 長期投与により、腸間膜静脈硬化症があらわれることがある。腹痛、下痢、便秘、腹部膨満感等が繰り返しあらわれた場合、又は便潜血陽性になつた場合には投与を中止し、CT、大腸内視鏡等の検査を実施するとともに、適切な処置を行うこと。なお、腸管切除術に至った症例も報告されている。	TJ-15、24、50、56、57、58、62、76、80、90、104、135、137
その他の副作用	*過敏症 (発疹、発赤、瘙痒、蕁麻疹等) このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。	TJ-1、2、3、5、6、7、9、10、11、12、14、15、16、17、18、19、20、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、34、36、37、38、39、40、41、43、45、47、48、50、52、54、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、73、75、82、86、89、91、96、97、98、99、100、102、104、106、107、108、109、111、114、115、116、117、120、121、123、125、127、128、134、136、137、501、3020
	自律神経系 (不眠、発汗過多、頻脈、動悸、全身脱力感、精神興奮等)	TJ-1、2、19、27、28、52、55、62、63、78、85、95、127
	*肝臓(肝機能異常(AST(GOT)、ALT(GPT)、Al-P、γ-GTP、T-Bil等の上昇))	TJ-7、16、17、23、27、31、34、38、43、54、68、100、105
	*消化器 (食欲不振、胃部不快感、恶心、嘔吐、腹痛、下痢、便秘、軟便、消化不良、口中不快感、口渴、腹部膨満感等)	TJ-1、2、3、6、7、8、9、10、12、15、19、22、23、24、25、27、28、33、34、36、38、40、41、43、46、47、48、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、61、62、63、64、65、67、68、71、74、76、77、78、80、83、84、85、86、87、89、90、92、93、95、96、97、100、102、103、104、105、106、107、108、109、112、113、114、121、123、124、125、126、127、133、134、135、136、137、3020
	泌尿器 (頻尿、排尿痛、血尿、残尿感、膀胱炎等) このような症状があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。	TJ-96、114
	*泌尿器 (排尿障害、血尿、残尿感、膀胱炎、頻尿、排尿痛等)	TJ-1、2、9、10、19、27、28、52、55、62、63、78、85、95、127
	*その他 (心悸亢進、のぼせ、舌のしびれ、恶心、全身倦怠感、傾眠、低カリウム血症、浮腫、血圧上昇等)	TJ-7、18、30、43、54、68、97、107、114、127、3023
	*その他の副作用のうち「過敏症」「肝臓」「消化器」「泌尿器」「その他」の各症状等につきましては、製品によって一部記載内容が異なりますので添付文書をご覧下さい。	

2021年7月改訂

PBA003 (審)
212107

株式会社ツムラ

東京都港区赤坂二丁目17番11号 TEL 03-5541-8521 https://www.tsumura.co.jp/

お客様相談窓口 【医療関係者の皆様】TEL 0120-329-970 【患者様・一般のお客様】TEL 0120-329-930

弊社の販売情報提供活動について liaison@mail.tsumura.co.jp