

表 125 2014年導入患者、年齢、原疾患別

原疾患	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差	
慢性糸球体腎炎 (%)		1 (25.0)	2 (18.2)	8 (22.2)	22 (33.3)	39 (32.5)	72 (27.6)	139 (26.4)	215 (21.0)	276 (19.4)	311 (17.1)	399 (16.3)	607 (16.0)	839 (16.6)	905 (16.8)	995 (17.5)	943 (18.3)	563 (20.0)	116 (18.2)	14 (16.9)	6,466 (17.8)			6,466 (17.8)	68.66	14.41	
慢性腎盂腎炎 (%)					2 (3.0)	2 (1.7)	2 (0.8)	10 (1.9)	4 (0.4)	10 (0.7)	10 (0.5)	24 (1.0)	22 (0.6)	32 (0.6)	31 (0.6)	52 (0.9)	45 (0.9)	20 (0.7)	4 (0.6)		270 (7.7)	1		271 (0.7)	68.86	14.60	
急速進行性糸球 体腎炎 (%)		1 (25.0)			3 (4.5)	2 (1.7)	2 (0.8)	3 (0.6)	5 (0.5)	12 (0.8)	14 (0.8)	14 (0.6)	46 (1.2)	57 (1.1)	87 (1.6)	105 (1.8)	98 (1.9)	55 (2.0)	15 (2.4)		519 (1.4)			519 (1.4)	72.86	12.46	
妊娠腎/妊娠中毒 症 (%)							1 (0.4)	1 (0.2)	2 (0.2)	3 (0.2)	1 (0.1)	9 (0.4)	1 (0.0)	5 (0.1)	7 (0.1)	7 (0.1)	3 (0.1)	2 (0.1)		42 (0.1)			42 (0.1)	64.81	14.13		
その他の分類不能 の腎炎 (%)	1 (10.0)		3 (27.3)	3 (8.3)	5 (7.6)	4 (3.3)	1 (0.4)	4 (0.8)	8 (0.8)	5 (0.4)	5 (0.3)	12 (0.5)	14 (0.4)	13 (0.3)	21 (0.4)	21 (0.4)	12 (0.2)	10 (0.4)	4 (0.6)		146 (0.4)			146 (0.4)	62.36	20.36	
多発性囊胞腎 (%)					1 (2.8)	2 (3.0)	3 (2.5)	6 (2.3)	16 (3.0)	50 (4.9)	88 (6.2)	108 (5.9)	122 (5.0)	148 (3.9)	125 (2.5)	118 (2.2)	88 (1.5)	74 (1.4)	41 (1.5)	8 (1.3)	1 (1.2)	999 (2.7)			999 (2.7)	63.05	13.11
腎硬化症 (%)			1 (9.1)	3 (8.3)	4 (6.1)	11 (9.2)	13 (5.0)	19 (3.6)	68 (6.6)	82 (5.8)	110 (6.0)	172 (7.0)	292 (7.7)	513 (10.1)	758 (14.1)	985 (17.3)	1,185 (23.0)	726 (25.9)	187 (29.4)	22 (26.5)	5,151 (14.2)			5,151 (14.2)	75.01	11.37	
悪性高血圧 (%)						2 (1.7)	11 (4.2)	20 (3.8)	18 (1.8)	17 (1.2)	24 (1.3)	17 (0.7)	29 (0.8)	26 (0.5)	33 (0.6)	41 (0.7)	46 (0.9)	24 (0.9)	7 (1.1)		315 (0.9)			315 (0.9)	64.95	16.72	
糖尿病性腎症 (%)				2 (5.6)	2 (3.0)	9 (7.5)	77 (29.5)	194 (36.8)	472 (46.1)	733 (51.5)	977 (53.6)	1,352 (55.2)	2,094 (55.1)	2,654 (52.4)	2,483 (46.2)	2,288 (40.2)	1,640 (31.8)	701 (25.0)	121 (19.0)	10 (12.0)	15,809 (43.5)			15,809 (43.5)	67.16	12.03	
SLE腎炎 (%)				2 (5.6)	3 (4.5)	5 (4.2)	4 (1.5)	10 (1.9)	19 (1.9)	17 (1.2)	13 (0.7)	21 (0.9)	25 (0.7)	37 (0.7)	33 (0.6)	32 (0.6)	29 (0.6)	13 (0.5)	4 (0.6)		267 (0.7)	1		268 (0.7)	63.55	16.42	
アミロイド腎 (%)								2 (0.4)	2 (0.2)	2 (0.1)	4 (0.2)	4 (0.2)	8 (0.2)	15 (0.3)	15 (0.3)	18 (0.3)	13 (0.3)	5 (0.2)		88 (0.2)			88 (0.2)	69.95	11.60		
痛風腎 (%)									1 (0.1)	1 (0.1)	6 (0.3)	10 (0.4)	10 (0.3)	8 (0.2)	10 (0.2)	14 (0.2)	8 (0.2)	4 (0.1)		72 (0.2)	1		73 (0.2)	68.43	10.75		
先天性代謝異常 による腎不全 (%)				1 (2.8)	2 (3.0)	3 (2.5)	2 (0.8)	2 (0.2)	2 (0.1)	2 (0.1)	2 (0.1)	2 (0.1)	2 (0.1)	2 (0.0)	2 (0.0)	2 (0.0)	1 (0.1)	2 (0.1)	2 (0.1)		23 (0.1)			23 (0.1)	49.17	21.58	
腎・尿路結核 (%)												1 (0.0)	1 (0.0)	2 (0.0)	2 (0.0)	1 (0.0)	2 (0.0)	2 (0.1)	1 (0.2)		12 (0.0)			12 (0.0)	75.75	10.62	
腎・尿路結石 (%)							1 (0.4)	1 (0.2)	2 (0.2)	1 (0.1)	3 (0.2)	5 (0.2)	6 (0.2)	7 (0.1)	9 (0.2)	7 (0.1)	15 (0.3)	4 (0.1)	2 (0.3)		63 (0.2)			63 (0.2)	70.17	13.79	
腎・尿路腫瘍 (%)				1 (2.8)				1 (0.2)	2 (0.2)	2 (0.1)	4 (0.2)	6 (0.2)	12 (0.3)	31 (0.6)	36 (0.7)	32 (0.6)	33 (0.6)	12 (0.4)	6 (0.9)		178 (0.5)			178 (0.5)	72.91	10.90	
閉塞性尿路障害 (%)						1 (0.8)	1 (0.4)	2 (0.4)	2 (0.2)	5 (0.4)	1 (0.1)	5 (0.2)	8 (0.2)	14 (0.3)	15 (0.3)	15 (0.3)	16 (0.3)	8 (0.3)	2 (0.3)		95 (0.3)			95 (0.3)	70.07	13.71	
骨髄腫 (%)				1 (2.8)	1 (1.5)				1 (0.1)	1 (0.1)	5 (0.3)	4 (0.2)	16 (0.4)	24 (0.5)	22 (0.4)	26 (0.5)	18 (0.3)	10 (0.4)	2 (0.3)	1 (1.2)	132 (0.4)			132 (0.4)	71.60	11.73	
腎形成不全 (%)	4 (40.0)	1 (25.0)	2 (18.2)	7 (19.4)	4 (6.1)	5 (4.2)	9 (3.4)	5 (0.9)	2 (0.2)	1 (0.1)		2 (0.1)	2 (0.1)	4 (0.1)	5 (0.1)	2 (0.0)	2 (0.0)	4 (0.1)		1 (0.2)	60 (0.2)			60 (0.2)	39.82	24.64	
不明 (%)	1 (10.0)		1 (9.1)	3 (8.3)	7 (10.6)	16 (13.3)	30 (11.5)	62 (11.8)	98 (9.6)	101 (7.1)	151 (8.3)	177 (7.2)	313 (8.2)	469 (9.3)	568 (10.6)	724 (12.7)	726 (14.1)	498 (17.7)	117 (18.4)	30 (36.1)	4,092 (11.3)	10		4,102 (11.3)	72.04	13.52	
再導入 (%)					3 (4.5)	6 (5.0)	12 (4.6)	9 (1.7)	14 (1.4)	18 (1.3)	26 (1.4)	27 (1.1)	16 (0.4)	24 (0.5)	14 (0.3)	14 (0.2)	4 (0.3)	3 (0.1)		204 (0.6)			204 (0.6)	57.60	16.13		
その他 (%)	4 (40.0)	1 (25.0)	2 (18.2)	4 (11.1)	6 (9.1)	12 (10.0)	17 (6.5)	29 (5.5)	37 (3.6)	45 (3.2)	47 (2.6)	67 (2.7)	124 (3.3)	167 (3.3)	207 (3.8)	217 (3.8)	230 (4.5)	104 (3.7)	36 (5.7)	5 (6.0)	1,361 (3.7)			1,361 (3.7)	69.29	15.28	
合計 (%)	10 (100.0)	4 (100.0)	11 (100.0)	36 (100.0)	66 (100.0)	120 (100.0)	261 (100.0)	527 (100.0)	1,024 (100.0)	1,422 (100.0)	1,822 (100.0)	2,450 (100.0)	3,798 (100.0)	5,069 (100.0)	5,378 (100.0)	5,685 (100.0)	5,154 (100.0)	2,808 (100.0)	636 (100.0)	83 (100.0)	36,364 (100.0)	13 (100.0)		36,377 (100.0)	69.04	13.39	
記載なし																											
総計	10	4	11	36	66	120	261	527	1,024	1,422	1,822	2,450	3,798	5,069	5,378	5,685	5,154	2,808	636	83	36,364	13		36,377	69.04	13.39	

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査