

表 134 2014年導入患者、治療方法(新分類)、原疾患別

原疾患	施設血液透析	Off-line HDF	On-line HDF	Push/Pull HDF	ハイオフフロー透析	血液濾過	血液吸着透析 (リクセル)	血液吸着透析 (その他)	在宅血液透析	腹膜透析 (CAPD)	腹膜透析 (APD)	腹膜透析 (CCPD)	透析離脱	生体腎移植 (親から)	生体腎移植 (祖父母から)	生体腎移植 (兄弟から)	生体腎移植 (子から)	生体腎移植 (それ以外の 血縁者から)	生体腎移植 (配偶者から)	生体腎移植 (上記以外から)	腎移植 (生体腎か献腎 か不明の場合)	献腎移植	合計	記載なし	総計	
慢性糸球体腎炎 (%)	5,131 (84.5)	33 (0.5)	322 (5.3)	5 (0.1)	3 (0.0)	3 (0.0)			3 (0.0)	290 (4.8)	153 (2.5)	47 (0.8)	6 (0.1)	40 (0.7)		5 (0.1)				26 (0.4)	1 (0.0)	2 (0.0)		6,070 (100.0)	396	6,466
慢性腎盂腎炎 (%)	213 (86.9)	2 (0.8)	6 (2.4)							14 (5.7)	6 (2.4)			4 (1.6)										245 (100.0)	26	271
急速進行性糸球 体腎炎 (%)	399 (91.7)	1 (0.2)	13 (3.0)		1 (0.2)					9 (2.1)	7 (1.6)		4 (0.9)							1 (0.2)				435 (100.0)	84	519
妊婦腎/妊婦中毒 症 (%)	33 (80.5)		7 (17.1)							1 (2.4)														41 (100.0)	1	42
その他の分類不 能の腎炎 (%)	109 (80.7)	1 (0.7)	3 (2.2)							10 (7.4)	10 (7.4)	1 (0.7)		1 (0.7)										135 (100.0)	11	146
多発性囊胞腎 (%)	831 (86.2)	7 (0.7)	52 (5.4)	1 (0.1)		3 (0.3)				28 (2.9)	27 (2.8)	2 (0.2)		5 (0.5)						1 (0.1)	7 (0.7)			964 (100.0)	35	999
腎硬化症 (%)	4,180 (87.9)	30 (0.6)	243 (5.1)	9 (0.2)	2 (0.0)	2 (0.0)			1 (0.0)	153 (3.2)	101 (2.1)	19 (0.4)	6 (0.1)	2 (0.0)		1 (0.0)	2 (0.0)			1 (0.0)				4,753 (100.0)	398	5,151
悪性高血圧 (%)	251 (84.5)	1 (0.3)	18 (6.1)							7 (2.4)	11 (3.7)	1 (0.3)	3 (1.0)	3 (1.0)		1 (0.3)				1 (0.3)				297 (100.0)	18	315
糖尿病性腎症 (%)	13,168 (88.4)	95 (0.6)	828 (5.6)	9 (0.1)	5 (0.0)	2 (0.0)			1 (0.0)	429 (2.9)	241 (1.6)	59 (0.4)	22 (0.1)	12 (0.1)		5 (0.0)	3 (0.0)					1 (0.0)		14,899 (100.0)	910	15,809
SLE腎炎 (%)	200 (82.6)	1 (0.4)	14 (5.8)			1 (0.4)	1 (0.4)			10 (4.1)	7 (2.9)	2 (0.8)	3 (1.2)	1 (0.4)								1 (0.4)		242 (100.0)	26	268
アミロイド腎 (%)	62 (83.8)	1 (1.4)	7 (9.5)	1 (1.4)						1 (1.4)	1 (1.4)													74 (100.0)	14	88
痛風腎 (%)	62 (87.3)		3 (4.2)							3 (4.2)	2 (2.8)													71 (100.0)	2	73
先天性代謝異常 による腎不全 (%)	19 (86.4)									3 (13.6)														22 (100.0)	1	23
腎・尿路結核 (%)	11 (91.7)		1 (8.3)																					12 (100.0)		12
腎・尿路結石 (%)	52 (91.2)		1 (1.8)							4 (7.0)														57 (100.0)	6	63
腎・尿路腫瘍 (%)	136 (88.3)	4 (2.6)	9 (5.8)							2 (1.3)	3 (1.9)													154 (100.0)	24	178
閉塞性尿路障害 (%)	72 (90.0)		1 (1.3)							2 (2.5)	2 (2.5)		1 (1.3)	1 (1.3)						1 (1.3)				80 (100.0)	15	95
骨髄腫 (%)	94 (89.5)	4 (3.8)	3 (2.9)							1 (1.0)	1 (1.0)		2 (1.9)											105 (100.0)	27	132
腎形成不全 (%)	30 (53.6)	1 (1.8)	4 (7.1)							3 (5.4)	10 (17.9)	3 (5.4)		5 (8.9)										56 (100.0)	4	60
不明 (%)	3,216 (88.4)	33 (0.9)	174 (4.8)		2 (0.1)		1 (0.0)			103 (2.8)	62 (1.7)	9 (0.2)	10 (0.3)	12 (0.3)		6 (0.2)				10 (0.3)	1 (0.0)	1 (0.0)		3,640 (100.0)	462	4,102
再導入 (%)	155 (82.0)	2 (1.1)	12 (6.3)						2 (1.1)	3 (1.6)	2 (1.1)			5 (2.6)		1 (0.5)	3 (1.6)			4 (2.1)				189 (100.0)	15	204
その他 (%)	1,036 (88.1)	12 (1.0)	56 (4.8)			1 (0.1)				22 (1.9)	27 (2.3)	4 (0.3)	12 (1.0)	3 (0.3)		1 (0.1)						2 (0.2)		1,176 (100.0)	185	1,361
合計 (%)	29,460 (87.4)	228 (0.7)	1,777 (5.3)	25 (0.1)	13 (0.0)	12 (0.0)	2 (0.0)		7 (0.0)	1,097 (3.3)	674 (2.0)	147 (0.4)	69 (0.2)	94 (0.3)		20 (0.1)	8 (0.0)	2 (0.0)		73 (0.2)	2 (0.0)	6 (0.0)	1 (0.0)	33,717 (100.0)	2,660	36,377
記載なし (%)																										
総計 (%)	29,460 (87.4)	228 (0.7)	1,777 (5.3)	25 (0.1)	13 (0.0)	12 (0.0)	2 (0.0)		7 (0.0)	1,097 (3.3)	674 (2.0)	147 (0.4)	69 (0.2)	94 (0.3)		20 (0.1)	8 (0.0)	2 (0.0)		73 (0.2)	2 (0.0)	6 (0.0)	1 (0.0)	33,717 (100.0)	2,660	36,377

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
*腹膜透析 (CCPD) は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査