

表 136 2014年導入患者死亡原因分類(性別との関係)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	335	212	547		547
(%)	(22.8)	(25.5)	(23.8)		(23.8)
脳血管障害	67	37	104		104
(%)	(4.6)	(4.5)	(4.5)		(4.5)
感染症	386	206	592		592
(%)	(26.3)	(24.8)	(25.8)		(25.8)
消化管出血	31	21	52		52
(%)	(2.1)	(2.5)	(2.3)		(2.3)
悪性腫瘍	186	77	263		263
(%)	(12.7)	(9.3)	(11.4)		(11.4)
悪液質/尿毒症	60	39	99		99
(%)	(4.1)	(4.7)	(4.3)		(4.3)
心筋梗塞	46	29	75		75
(%)	(3.1)	(3.5)	(3.3)		(3.3)
カリウム中毒/頓死	23	15	38		38
(%)	(1.6)	(1.8)	(1.7)		(1.7)
肝硬変症	15	10	25		25
(%)	(1.0)	(1.2)	(1.1)		(1.1)
自殺/拒否	18	3	21		21
(%)	(1.2)	(0.4)	(0.9)		(0.9)
腸閉塞	14	11	25		25
(%)	(1.0)	(1.3)	(1.1)		(1.1)
肺血栓/肺塞栓	8	1	9		9
(%)	(0.5)	(0.1)	(0.4)		(0.4)
災害・事故死	8	3	11		11
(%)	(0.5)	(0.4)	(0.5)		(0.5)
その他	156	102	258		258
(%)	(10.6)	(12.3)	(11.2)		(11.2)
不明	115	65	180		180
(%)	(7.8)	(7.8)	(7.8)		(7.8)
合計	1,468	831	2,299		2,299
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	1,468	831	2,299		2,299

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査