

表 138 2014年導入患者死亡原因分類(透析期間との関係)

死因	3ヶ月未満	3ヶ月～	6ヶ月～	1年～	2年～	5年～	10年～	15年～	20年～	25年～	合計	不明	記載なし	総計
心不全	303 (%)	139 (24.4)	105 (21.6)								547 (23.8)			547 (23.8)
脳血管障害	48 (%)	34 (3.9)	22 (5.3)								104 (4.5)			104 (4.5)
感染症	326 (%)	163 (26.2)	101 (25.3)								590 (25.7)	2		592 (25.8)
消化管出血	38 (%)	8 (3.1)	6 (1.2)								52 (2.3)			52 (2.3)
悪性腫瘍	122 (%)	79 (9.8)	62 (12.3)								263 (11.5)			263 (11.4)
悪液質/尿毒症	55 (%)	26 (4.4)	18 (4.0)								99 (4.3)			99 (4.3)
心筋梗塞	35 (%)	29 (2.8)	11 (4.5)								75 (3.3)			75 (3.3)
カリウム中毒/頓死	13 (%)	13 (1.0)	12 (2.0)								38 (1.7)			38 (1.7)
肝硬変症	15 (%)	6 (1.2)	4 (0.9)								25 (1.1)			25 (1.1)
自殺/拒否	6 (%)	12 (0.5)	3 (1.9)								21 (0.9)			21 (0.9)
腸閉塞	16 (%)	6 (1.3)	3 (0.9)								25 (1.1)			25 (1.1)
肺血栓/肺塞栓	5 (%)	3 (0.4)	1 (0.5)								9 (0.4)			9 (0.4)
災害・事故死	5 (%)	2 (0.4)	4 (0.3)								11 (0.5)			11 (0.5)
その他	158 (%)	72 (12.7)	28 (11.2)								258 (11.2)			258 (11.2)
不明	99 (%)	51 (8.0)	29 (7.9)								179 (7.8)	1		180 (7.8)
合計	1,244 (%)	643 (100.0)	409 (100.0)								2,296 (100.0)	3		2,299 (100.0)
記載なし														
総計	1,244	643	409								2,296	3		2,299

数値下の括弧内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査