

表 140 2014年導入患者死亡原因分類(年齢別, 原疾患別)原疾患＝慢性糸球体腎炎

死因	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
心不全 (%)											1 (16.7)	3 (100.0)	4 (36.4)	6 (33.3)	9 (26.5)	22 (35.5)	27 (32.5)	20 (30.8)	9 (40.9)	1 (50.0)	102 (32.9)			102 (32.9)	79.65	9.11
脳血管障害 (%)											2 (33.3)			1 (5.6)		4 (6.5)	6 (7.2)	4 (6.2)	1 (4.5)		18 (5.8)			18 (5.8)	78.33	10.76
感染症 (%)													4 (36.4)	7 (38.9)	11 (32.4)	14 (22.6)	20 (24.1)	11 (16.9)	5 (22.7)	1 (50.0)	73 (23.5)			73 (23.5)	78.64	8.05
消化管出血 (%)																	3 (3.6)	4 (6.2)			7 (2.3)			7 (2.3)	84.71	3.40
悪性腫瘍 (%)										1 (50.0)				2 (11.1)	4 (11.8)	8 (12.9)	4 (4.8)	4 (6.2)			23 (7.4)			23 (7.4)	76.91	8.48
悪液質/尿毒症 (%)															1 (2.9)	1 (1.6)	5 (6.0)	12 (18.5)	2 (9.1)		21 (6.8)			21 (6.8)	85.24	4.15
心筋梗塞 (%)															1 (2.9)	1 (1.6)	1 (1.2)	2 (3.1)			5 (1.6)			5 (1.6)	81.20	6.18
カリウム中毒/頓死 (%)											1 (16.7)		1 (9.1)	1 (5.6)		1 (1.6)	1 (1.2)				5 (1.6)			5 (1.6)	68.60	10.64
肝硬変症 (%)														1 (5.6)			2 (2.4)				3 (1.0)			3 (1.0)	77.00	7.81
自殺/拒否 (%)																	1 (1.2)	2 (3.1)			3 (1.0)			3 (1.0)	85.67	3.06
腸閉塞 (%)															1 (2.9)		1 (1.2)				2 (0.6)			2 (0.6)	79.00	7.07
肺血栓/肺塞栓 (%)																1 (1.6)					1 (0.3)			1 (0.3)	77.00	
災害・事故死 (%)											1 (16.7)										1 (0.3)			1 (0.3)	52.00	
その他 (%)								1 (100.0)					1 (9.1)		5 (14.7)	5 (8.1)	5 (6.0)	4 (6.2)	4 (18.2)		25 (8.1)			25 (8.1)	78.36	11.80
不明 (%)								1 (100.0)	1 (100.0)	1 (100.0)	1 (16.7)		1 (9.1)		2 (5.9)	5 (8.1)	7 (8.4)	2 (3.1)	1 (4.5)		21 (6.8)			21 (6.8)	75.38	13.15
合計 (%)								1 (100.0)	1 (100.0)	2 (100.0)	6 (100.0)	3 (100.0)	11 (100.0)	18 (100.0)	34 (100.0)	62 (100.0)	83 (100.0)	65 (100.0)	22 (100.0)	2 (100.0)	310 (100.0)			310 (100.0)	79.01	9.44
記載なし																										
総計								1	1	2	6	3	11	18	34	62	83	65	22	2	310			310	79.01	9.44

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査