

表 142 2014年導入患者死亡原因分類(年齢別、原疾患別)原疾患=急速進行性糸球体腎炎

死因	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
心不全 (%)							1 (100.0)							2 (14.3)	2 (10.5)	7 (20.6)	1 (6.3)	2 (50.0)		15 (15.2)			15	77.73	14.41	
脳血管障害 (%)										1 (33.3)										1 (1.0)			1 (1.0)	62.00		
感染症 (%)										2 (100.0)	3 (50.0)	5 (35.7)	9 (47.4)	16 (47.1)	6 (37.5)	2 (50.0)					43 (43.4)			43 (43.4)	78.86	7.66
消化管出血 (%)										1 (33.3)	1 (7.1)	1 (5.3)	1 (2.9)	2 (12.5)							6 (6.1)			6 (6.1)	77.17	8.80
悪性腫瘍 (%)											1 (7.1)	2 (10.5)	1 (2.9)	1 (2.9)	3 (8.8)	3 (18.8)					4 (4.0)			4 (4.0)	76.25	4.35
悪液質/尿毒症 (%)																				7 (7.1)			7 (7.1)	83.86	3.93	
心筋梗塞 (%)																				1 (1.0)			1 (1.0)	82.00		
カリウム中毒/頓死 (%)																										
肝硬変症 (%)																					2 (2.0)			2 (2.0)	68.50	2.12
自殺/拒否 (%)											1 (33.3)	1 (16.7)	1 (7.1)							1 (6.3)			2 (2.0)		72.50	17.68
腸閉塞 (%)																										
肺血栓/肺塞栓 (%)																										
災害・事故死 (%)																										
その他 (%)																					13 (13.1)			13 (13.1)	78.38	6.10
不明 (%)																				5 (5.1)			5 (5.1)	78.00	8.89	
合計 (%)						1 (100.0)				2 (100.0)	3 (100.0)	6 (100.0)	14 (100.0)	19 (100.0)	34 (100.0)	16 (100.0)	4 (100.0)		99 (100.0)			99 (100.0)		78.25	8.91	
記載なし																										
総計						1				2	3	6	14	19	34	16	4		99			99	78.25	8.91		

数値下の括弧内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査