

表 144 2014年導入患者死亡原因分類(年齢別、原疾患別)原疾患=その他分類不能の腎炎

死因	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
心不全 (%)														1 (100.0)		1 (33.3)					1 (10.0)			1 (10.0)		79.00
脳血管障害 (%)															1 (100.0)		1 (100.0)				1 (10.0)			1 (10.0)		63.00
感染症 (%)																1 (100.0)		1 (50.0)			2 (20.0)			2 (20.0)		80.00
消化管出血 (%)																1 (33.3)		1 (50.0)			2 (20.0)			2 (20.0)		83.00
悪性腫瘍 (%)																									8.49	
悪液質/尿毒症 (%)																									11.31	
心筋梗塞 (%)																										
カリウム中毒/頓死 (%)																										
肝硬変症 (%)																										
自殺/拒否 (%)																										
腸閉塞 (%)																										
肺血栓/肺塞栓 (%)																										
災害・事故死 (%)																										
その他 (%)								1 (100.0)			1 (100.0)				1 (33.3)					3 (30.0)			3 (30.0)		55.00	
不明 (%)																				1 (10.0)			1 (10.0)		91.00	
合計 (%)								1 (100.0)			1 (100.0)			1 (100.0)	3 (100.0)		2 (100.0)	1 (100.0)	1 (100.0)	10 (100.0)			10 (100.0)		72.40	
記載なし																										
総計								1			1		1		1	3		2	1	10			10		72.40	
																									17.23	

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査