

表 154 2014年導入患者死亡原因分類(年齢別、原疾患別)原疾患=腎・尿路結石

死因	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差	
心不全 (%)																	1 (50.0)	1 (50.0)			2 (40.0)			2 (40.0)	83.50	2.12	
脳血管障害 (%)																	1 (50.0)	1 (50.0)			2 (40.0)			2 (40.0)	83.50	2.12	
感染症 (%)																	1 (50.0)	1 (50.0)			2 (40.0)			2 (40.0)	83.50	2.12	
消化管出血 (%)																	1 (50.0)	1 (50.0)			2 (40.0)			2 (40.0)	83.50	2.12	
悪性腫瘍 (%)																	1 (50.0)	1 (50.0)			2 (40.0)			2 (40.0)	83.50	2.12	
悪液質/尿毒症 (%)																	1 (50.0)	1 (50.0)			2 (40.0)			2 (40.0)	83.50	2.12	
心筋梗塞 (%)																	1 (50.0)	1 (50.0)			2 (40.0)			2 (40.0)	83.50	2.12	
カリウム中毒/頓死 (%)																	1 (50.0)	1 (50.0)			2 (40.0)			2 (40.0)	83.50	2.12	
肝硬変症 (%)																	1 (50.0)	1 (50.0)			2 (40.0)			2 (40.0)	83.50	2.12	
自殺/拒否 (%)																	1 (50.0)	1 (50.0)			2 (40.0)			2 (40.0)	83.50	2.12	
腸閉塞 (%)																	1 (50.0)	1 (50.0)			2 (40.0)			2 (40.0)	83.50	2.12	
肺血栓/肺塞栓 (%)																	1 (50.0)	1 (50.0)			2 (40.0)			2 (40.0)	83.50	2.12	
災害・事故死 (%)																	1 (50.0)	1 (50.0)			2 (40.0)			2 (40.0)	83.50	2.12	
その他 (%)																	1 (100.0)	1 (100.0)			2 (20.0)			2 (20.0)	68.00	2.12	
不明 (%)																	1 (100.0)	1 (100.0)			2 (20.0)			2 (20.0)	68.00	2.12	
合計 (%)																	1 (100.0)	1 (100.0)			2 (100.0)			2 (100.0)	80.40	7.09	
記載なし																											
総計																	1 (100.0)	1 (100.0)			2 (100.0)			2 (100.0)	80.40	7.09	

数値下のカッコ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査