

表 161 2014年導入患者死亡原因分類(年齢別, 原疾患別)原疾患＝その他

死因	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
心不全 (%)				1 (100.0)					1 (100.0)				2 (12.5)	6 (28.6)	6 (17.1)	7 (13.5)	15 (28.3)	7 (24.1)	3 (42.9)		48 (20.3)			48 (20.3)	76.75	12.93
脳血管障害 (%)										2 (50.0)				1 (4.8)		3 (5.8)	1 (1.9)	1 (3.4)			8 (3.4)			8 (3.4)	69.63	15.88
感染症 (%)								1 (100.0)				2 (33.3)	4 (25.0)	4 (19.0)	12 (34.3)	13 (25.0)	17 (32.1)	8 (27.6)	2 (28.6)		63 (26.7)			63 (26.7)	76.38	9.70
消化管出血 (%)														1 (4.8)		2 (3.8)	2 (3.8)				5 (2.1)			5 (2.1)	76.80	7.01
悪性腫瘍 (%)											3 (42.9)	3 (50.0)	3 (18.8)	1 (4.8)	10 (28.6)	7 (13.5)	6 (11.3)	3 (10.3)		1 (100.0)	37 (15.7)			37 (15.7)	72.08	10.89
悪液質/尿毒症 (%)													1 (6.3)				1 (1.9)				2 (0.8)			2 (0.8)	73.00	14.14
心筋梗塞 (%)														1 (4.8)		1 (1.9)	1 (1.9)	1 (3.4)			4 (1.7)			4 (1.7)	77.50	8.96
カリウム中毒/頓死 (%)																										
肝硬変症 (%)											1 (14.3)		1 (6.3)		1 (2.9)	1 (1.9)		1 (3.4)			5 (2.1)			5 (2.1)	69.80	13.66
自殺/拒否 (%)																1 (2.9)	2 (3.8)				3 (1.3)			3 (1.3)	76.00	2.65
腸閉塞 (%)																1 (2.9)	1 (1.9)	1 (1.9)			3 (1.3)			3 (1.3)	77.00	5.29
肺血栓/肺塞栓 (%)																			1 (3.4)		1 (0.4)			1 (0.4)	89.00	
災害・事故死 (%)																										
その他 (%)							2 (100.0)			2 (50.0)	2 (28.6)	1 (16.7)	4 (25.0)	5 (23.8)	3 (8.6)	12 (23.1)	5 (9.4)	6 (20.7)	2 (28.6)		44 (18.6)			44 (18.6)	71.86	14.91
不明 (%)											1 (14.3)		1 (6.3)	2 (9.5)	1 (2.9)	3 (5.8)	4 (7.5)	1 (3.4)			13 (5.5)			13 (5.5)	74.92	10.26
合計 (%)				1 (100.0)			2 (100.0)	1 (100.0)	1 (100.0)	4 (100.0)	7 (100.0)	6 (100.0)	16 (100.0)	21 (100.0)	35 (100.0)	52 (100.0)	53 (100.0)	29 (100.0)	7 (100.0)	1 (100.0)	236 (100.0)			236 (100.0)	74.55	11.96
記載なし																										
総計				1			2	1	1	4	7	6	16	21	35	52	53	29	7	1	236			236	74.55	11.96

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査