

表 218 2014年末患者、年齢、原疾患別人数(女性)

原疾患	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)			2 (9.5)	10 (27.0)	27 (28.7)	71 (31.3)	202 (33.7)	475 (37.9)	973 (37.3)	1,583 (39.9)	2,196 (39.3)	3,199 (38.6)	5,327 (38.9)	6,582 (36.6)	6,210 (35.0)	5,111 (32.1)	3,877 (29.6)	2,214 (27.8)	661 (27.2)	102 (28.3)	38,822 (34.7)			38,822 (34.7)	67.76	12.34
慢性腎盂腎炎 (%)				1 (2.7)	4 (4.3)	8 (3.5)	12 (2.0)	34 (2.7)	58 (2.2)	85 (2.1)	104 (1.9)	134 (1.6)	196 (1.4)	273 (1.5)	245 (1.4)	215 (1.3)	151 (1.2)	87 (1.1)	30 (1.2)	7 (1.9)	1,644 (1.5)			1,644 (1.5)	66.58	13.49
急速進行性糸球体腎炎 (%)		2 (11.8)			3 (3.2)	5 (2.2)	10 (1.7)	13 (1.0)	29 (1.1)	42 (1.1)	43 (0.8)	78 (0.9)	125 (0.9)	158 (0.9)	208 (1.2)	191 (1.2)	187 (1.4)	95 (1.2)	23 (0.9)	3 (0.8)	1,215 (1.1)			1,215 (1.1)	69.91	13.25
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)							7 (1.2)	10 (0.8)	48 (1.8)	82 (2.1)	124 (1.9)	160 (2.2)	305 (1.9)	340 (1.5)	268 (1.0)	166 (0.5)	71 (0.3)	20 (0.3)	2 (0.1)		1,603 (1.4)			1,603 (1.4)	64.55	10.20
その他の分類不能の腎炎 (%)	1 (5.0)	1 (5.9)	1 (4.8)		7 (7.4)	8 (3.5)	14 (2.3)	19 (1.5)	34 (1.3)	44 (1.1)	38 (0.7)	51 (0.6)	66 (0.5)	62 (0.3)	67 (0.4)	64 (0.4)	47 (0.4)	28 (0.4)	12 (0.5)	1 (0.3)	565 (0.5)			565 (0.5)	62.65	16.47
多発性囊胞腎 (%)	2 (10.0)	2 (11.8)			3 (2.7)	6 (2.6)	12 (2.0)	33 (2.6)	88 (3.4)	178 (4.5)	335 (6.0)	539 (6.5)	845 (6.2)	962 (5.3)	841 (4.7)	619 (3.9)	361 (2.8)	159 (2.0)	30 (1.2)	5 (1.4)	5,021 (4.5)			5,021 (4.5)	66.45	10.84
腎硬化症 (%)			1 (4.8)		3 (3.2)	10 (4.4)	12 (2.0)	29 (2.3)	83 (3.2)	119 (3.0)	183 (3.3)	304 (3.7)	610 (4.5)	970 (5.4)	1,258 (7.1)	1,614 (10.1)	2,006 (15.3)	1,595 (20.0)	637 (26.2)	110 (30.6)	9,544 (8.5)			9,544 (8.5)	76.27	11.21
悪性高血圧 (%)					2 (2.1)	1 (0.4)	8 (1.3)	11 (0.9)	25 (1.0)	49 (1.2)	56 (1.0)	62 (0.7)	99 (0.7)	123 (0.7)	106 (0.6)	106 (0.7)	98 (0.7)	66 (0.8)	20 (0.8)	7 (1.9)	839 (0.7)			839 (0.7)	67.93	13.84
糖尿病性腎症 (%)	1 (5.0)		2 (9.5)	3 (8.1)	3 (3.2)	21 (9.3)	112 (18.7)	297 (23.7)	711 (27.2)	1,057 (26.6)	1,632 (29.2)	2,532 (30.6)	4,309 (31.5)	6,232 (34.6)	6,168 (34.7)	5,403 (33.9)	4,118 (31.4)	2,184 (27.4)	498 (20.5)	50 (13.9)	35,333 (31.6)			35,333 (31.6)	69.24	11.51
SLE腎炎 (%)				1 (2.7)	4 (4.3)	9 (4.0)	23 (3.8)	52 (4.1)	96 (3.7)	151 (3.8)	159 (2.8)	200 (2.4)	230 (1.7)	224 (1.2)	156 (0.9)	115 (0.7)	70 (0.5)	38 (0.5)	8 (0.3)	1 (0.3)	1,537 (1.4)			1,537 (1.4)	60.53	13.15
アミロイド腎 (%)								1 (0.1)	3 (0.1)	6 (0.2)	14 (0.3)	13 (0.2)	36 (0.3)	51 (0.3)	55 (0.3)	45 (0.2)	32 (0.2)	12 (0.2)	3 (0.1)		271 (0.2)			271 (0.2)	69.65	10.14
痛風腎 (%)									4 (0.2)	8 (0.2)	7 (0.1)	9 (0.1)	18 (0.1)	17 (0.1)	23 (0.1)	20 (0.1)	14 (0.1)	8 (0.1)	1 (0.0)		129 (0.1)			129 (0.1)	68.36	11.92
先天性代謝異常による腎不全 (%)	1 (5.0)		1 (2.7)	4 (4.3)	6 (2.6)	9 (1.5)	7 (0.6)	15 (0.6)	12 (0.3)	8 (0.1)	8 (0.1)	12 (0.1)	13 (0.1)	6 (0.0)	5 (0.0)	1 (0.0)	4 (0.1)				112 (0.1)			112 (0.1)	51.30	17.44
腎・尿路結核 (%)											1 (0.0)	4 (0.0)	10 (0.1)	20 (0.1)	25 (0.1)	7 (0.0)	22 (0.2)	4 (0.1)	3 (0.1)		96 (0.1)			96 (0.1)	72.90	8.57
腎・尿路結石 (%)							1 (0.2)	2 (0.2)	3 (0.1)		9 (0.2)	14 (0.2)	17 (0.3)	45 (0.2)	28 (0.2)	33 (0.2)	43 (0.3)	18 (0.2)	5 (0.2)	1 (0.3)	219 (0.2)			219 (0.2)	71.96	11.56
腎・尿路腫瘍 (%)				1 (2.7)			1 (0.2)	3 (0.2)	3 (0.1)	3 (0.1)	4 (0.1)	7 (0.1)	16 (0.1)	34 (0.2)	38 (0.2)	28 (0.2)	52 (0.4)	19 (0.2)	6 (0.2)	1 (0.3)	216 (0.2)			216 (0.2)	72.79	11.95
閉塞性尿路障害 (%)	1 (5.0)		1 (4.8)			6 (2.6)	11 (1.8)	14 (1.1)	16 (0.6)	10 (0.3)	18 (0.3)	16 (0.2)	27 (0.2)	29 (0.2)	28 (0.2)	30 (0.2)	25 (0.4)	14 (0.2)	5 (0.2)		251 (0.2)	1 (20.0)		252 (0.2)	62.55	17.40
骨髄腫 (%)				1 (2.7)					1 (0.0)	3 (0.1)	6 (0.1)	3 (0.0)	13 (0.1)	15 (0.1)	16 (0.1)	16 (0.1)	16 (0.1)	9 (0.1)	2 (0.1)	2 (0.6)	103 (0.1)			103 (0.1)	71.30	12.81
腎形成不全 (%)	4 (20.0)	4 (23.5)	6 (28.6)	7 (18.9)	9 (9.6)	13 (5.7)	22 (3.7)	32 (2.6)	35 (1.3)	18 (0.5)	20 (0.4)	13 (0.2)	12 (0.1)	12 (0.1)	12 (0.1)	14 (0.1)	6 (0.0)	5 (0.1)	4 (0.2)		248 (0.2)			248 (0.2)	46.72	20.28
不明 (%)	1 (5.0)		2 (9.5)	8 (21.6)	7 (7.4)	26 (11.5)	60 (10.0)	112 (8.9)	207 (7.9)	303 (7.6)	383 (6.8)	635 (7.7)	1,018 (7.4)	1,380 (7.7)	1,568 (8.8)	1,701 (10.7)	1,541 (11.7)	1,168 (14.6)	397 (16.4)	59 (16.4)	10,576 (9.4)	3 (60.0)		10,579 (9.4)	71.47	12.99
再導入 (%)			2 (9.5)		8 (8.5)	9 (4.0)	25 (4.2)	32 (2.6)	67 (2.6)	73 (1.8)	93 (1.7)	125 (1.5)	107 (0.8)	95 (0.5)	33 (0.2)	24 (0.2)	25 (0.2)	13 (0.2)	5 (0.2)		736 (0.7)			736 (0.7)	56.37	13.65
その他 (%)	9 (45.0)	8 (47.1)	4 (19.0)	3 (8.1)	10 (10.6)	28 (12.3)	58 (9.7)	78 (6.2)	112 (4.3)	145 (3.7)	161 (2.9)	177 (2.1)	281 (2.1)	350 (1.9)	394 (2.2)	405 (2.5)	354 (2.7)	218 (2.7)	76 (3.1)	11 (3.1)	2,882 (2.6)	1 (20.0)		2,883 (2.6)	66.73	16.10
合計 (%)	20 (100.0)	17 (100.0)	21 (100.0)	37 (100.0)	94 (100.0)	227 (100.0)	599 (100.0)	1,254 (100.0)	2,611 (100.0)	3,971 (100.0)	5,594 (100.0)	8,283 (100.0)	13,679 (100.0)	17,987 (100.0)	17,753 (100.0)	15,932 (100.0)	13,117 (100.0)	7,978 (100.0)	2,428 (100.0)	360 (100.0)	111,962 (100.0)	5 (100.0)		111,967 (100.0)	68.94	12.60
記載なし																										
総計	20	17	21	37	94	227	599	1,254	2,611	3,971	5,594	8,283	13,679	17,987	17,753	15,932	13,117	7,978	2,428	360	111,962	5		111,967	68.94	12.60

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する％です。
 (C)Japanese Society for Dialysis Therapy
 2014年調査