

表 224 2014年末患者, 治療方法(新分類), 性別

治療方法 (新分類)	男性	女性	合計	記載なし	総計
施設血液透析	163,806	91,835	255,641		255,641
(%)	(82.7)	(82.0)	(82.4)		(82.4)
Off-line HDF	3,731	2,584	6,315		6,315
(%)	(1.9)	(2.3)	(2.0)		(2.0)
On-line HDF	23,085	13,005	36,090		36,090
(%)	(11.7)	(11.6)	(11.6)		(11.6)
Push/Pull HDF	315	222	537		537
(%)	(0.2)	(0.2)	(0.2)		(0.2)
ハイオフィльтраーション	185	156	341		341
(%)	(0.1)	(0.1)	(0.1)		(0.1)
血液濾過	60	32	92		92
(%)	(0.0)	(0.0)	(0.0)		(0.0)
血液吸着透析 (リクセル)	814	809	1,623		1,623
(%)	(0.4)	(0.7)	(0.5)		(0.5)
血液吸着透析 (その他)	5	2	7		7
(%)	(0.0)	(0.0)	(0.0)		(0.0)
在宅血液透析	398	123	521		521
(%)	(0.2)	(0.1)	(0.2)		(0.2)
腹膜透析 (CAPD)	3,132	1,889	5,021		5,021
(%)	(1.6)	(1.7)	(1.6)		(1.6)
腹膜透析 (APD)	1,872	967	2,839		2,839
(%)	(0.9)	(0.9)	(0.9)		(0.9)
腹膜透析 (CCPD)	738	343	1,081		1,081
(%)	(0.4)	(0.3)	(0.3)		(0.3)
合計	198,141	111,967	310,108		310,108
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	198,141	111,967	310,108		310,108

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査