

表 228 2014年末患者, 治療方法(新分類), 原疾患別

原疾患	施設血液透析	Off-line HDF	On-line HDF	Push/Pull HDF	ハイオフィルトレーション	血液濾過	血液吸着透析 (リクセル)	血液吸着透析 (その他)	在宅血液透析	腹膜透析 (CAPD)	腹膜透析 (APD)	腹膜透析 (CCPD)	合計	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎 (%)	76,117 (78.5)	2,631 (2.7)	13,397 (13.8)	158 (0.2)	125 (0.1)	19 (0.0)	1,192 (1.2)	2 (0.0)	270	1,760	873	426	96,970 (100.0)		96,970
慢性腎盂腎炎 (%)	2,456 (80.7)	69 (2.3)	380 (12.5)	8 (0.3)	5 (0.2)		19 (0.6)		12	54	27	12	3,042 (100.0)		3,042
急速進行性糸球 体腎炎 (%)	2,106 (84.4)	43 (1.7)	252 (10.1)	4 (0.2)	5 (0.2)		8 (0.3)		2	36	28	10	2,494 (100.0)		2,494
妊娠腎/妊娠中毒 症 (%)	1,156 (71.6)	73 (4.5)	300 (18.6)	1 (0.1)	4 (0.2)		47 (2.9)		1	20	6	6	1,614 (100.0)		1,614
その他の分類不 能の腎炎 (%)	1,058 (77.1)	31 (2.3)	173 (12.6)		3 (0.2)	1 (0.1)	17 (1.2)		5	39	29	17	1,373 (100.0)		1,373
多発性嚢胞腎 (%)	9,081 (82.5)	203 (1.8)	1,366 (12.4)	18 (0.2)	6 (0.1)	7 (0.1)	51 (0.5)		31	121	101	21	11,006 (100.0)		11,006
腎硬化症 (%)	24,036 (84.9)	372 (1.3)	2,689 (9.5)	51 (0.2)	20 (0.1)	11 (0.0)	19 (0.1)		17	615	362	106	28,298 (100.0)		28,298
悪性高血圧 (%)	2,110 (82.0)	46 (1.8)	297 (11.5)	1 (0.0)	2 (0.1)	1 (0.0)	6 (0.2)		3	56	37	14	2,573 (100.0)		2,573
糖尿病性腎症 (%)	100,830 (85.4)	1,898 (1.6)	12,038 (10.2)	127 (0.2)	86 (0.1)	33 (0.0)	1,582 (0.1)	2 (0.0)	80	1,582	874	310	118,081 (100.0)		118,081
SLE腎炎 (%)	1,757 (78.6)	60 (2.7)	324 (14.5)	6 (0.3)	4 (0.2)	1 (0.0)	15 (0.7)		7	32	22	8	2,236 (100.0)		2,236
アミロイド腎 (%)	376 (83.4)	9 (2.0)	54 (12.0)	1 (0.2)					2	5	3	1	451 (100.0)		451
痛風腎 (%)	907 (81.5)	26 (2.3)	135 (12.1)		2 (0.2)		9 (0.8)		1	14	12	7	1,113 (100.0)		1,113
先天性代謝異常 による腎不全 (%)	201 (73.9)	7 (2.6)	42 (15.4)	1 (0.4)					3	8	4	6	272 (100.0)		272
腎・尿路結核 (%)	175 (85.0)	4 (1.9)	20 (9.7)				6 (2.9)			1			206 (100.0)		206
腎・尿路結石 (%)	488 (84.0)	13 (2.2)	57 (9.8)	2 (0.3)			4 (0.7)		1	13	2	1	581 (100.0)		581
腎・尿路腫瘍 (%)	771 (87.0)	18 (2.0)	79 (8.9)	3 (0.3)			1 (0.1)			6	6	2	886 (100.0)		886
閉塞性尿路障害 (%)	616 (85.2)	10 (1.4)	68 (9.4)	1 (0.1)	1 (0.1)		4 (0.6)		1	11	8	3	723 (100.0)		723
骨髄腫 (%)	245 (88.8)	10 (3.6)	13 (4.7)							5	2	1	276 (100.0)		276
腎形成不全 (%)	455 (70.1)	16 (2.5)	93 (14.3)		2 (0.3)	1 (0.2)	6 (0.9)			22	37	17	649 (100.0)		649
不明 (%)	22,799 (82.8)	558 (2.0)	3,154 (11.5)	30 (0.1)	21 (0.1)	15 (0.1)	76 (0.3)		51	480	282	78	27,544 (100.0)		27,544
再導入 (%)	1,613 (74.6)	78 (3.6)	365 (16.9)	3 (0.1)	4 (0.2)		34 (1.6)		15	26	11	14	2,163 (100.0)		2,163
その他 (%)	6,288 (83.2)	140 (1.9)	794 (10.5)	28 (0.4)	10 (0.1)	3 (0.0)	23 (0.3)	3 (0.0)	19	115	113	21	7,557 (100.0)		7,557
合計 (%)	255,641 (82.4)	6,315 (2.0)	36,090 (11.6)	537 (0.2)	341 (0.1)	92 (0.0)	1,623 (0.5)	7 (0.0)	521 (0.2)	5,021 (1.6)	2,839 (0.9)	1,081 (0.3)	310,108 (100.0)		310,108
記載なし (%)															
総計 (%)	255,641 (82.4)	6,315 (2.0)	36,090 (11.6)	537 (0.2)	341 (0.1)	92 (0.0)	1,623 (0.5)	7 (0.0)	521 (0.2)	5,021 (1.6)	2,839 (0.9)	1,081 (0.3)	310,108 (100.0)		310,108

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
*腹膜透析 (CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査