

表 232 2014年末患者, 治療方法(新分類), 併用の状況別

併用の状況	施設血液透析	Off-line HDF	On-line HDF	Push/Pull HDF	ハイオフィルトレーション	血液濾過	血液吸着透析 (リクセル)	血液吸着透析 (その他)	在宅血液透析	腹膜透析 (CAPD)	腹膜透析 (APD)	腹膜透析 (CCPD)	合計	記載なし	総計
HD(F)単独 (%)	255,316 (99.9)	6,306 (99.9)	36,056 (99.9)	537 (100.0)	340 (99.7)	91 (98.9)	1,623 (100.0)	7 (100.0)	518 (99.6)				300,794 (97.0)		300,794 (97.0)
PD単独 (%)										4,132 (82.3)	2,336 (82.3)	720 (66.8)	7,188 (2.3)		7,188 (2.3)
HD(F)単独,PDカテ あり (%)	245 (0.1)	4 (0.1)	18 (0.0)			1 (1.1)			1 (0.2)				269 (0.1)		269 (0.1)
PD,HD併用週1 HD(F) (%)										773 (15.4)	452 (15.9)	319 (29.6)	1,544 (0.5)		1,544 (0.5)
PD,HD併用週2 HD(F) (%)	28 (0.0)	2 (0.0)	6 (0.0)							77 (1.5)	40 (1.4)	24 (2.2)	177 (0.1)		177 (0.1)
PD,HD併用週3 HD(F) (%)	29 (0.0)	2 (0.0)	7 (0.0)		1 (0.3)				1 (0.2)				40 (0.0)		40 (0.0)
PD,HD併用週4 HD(F) (%)	1 (0.0)												1 (0.0)		1 (0.0)
PD,HD併用その他 (%)	8 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)							39 (0.8)	9 (0.3)	15 (1.4)	73 (0.0)		73 (0.0)
合計 (%)	255,627 (100.0)	6,315 (100.0)	36,088 (100.0)	537 (100.0)	341 (100.0)	92 (100.0)	1,623 (100.0)	7 (100.0)	520 (100.0)	5,021 (100.0)	2,837 (100.0)	1,078 (100.0)	310,086 (100.0)		310,086 (100.0)
不明	14		2						1		2	3	22		22
記載なし															
総計	255,641	6,315	36,090	537	341	92	1,623	7	521	5,021	2,839	1,081	310,108		310,108

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
*腹膜透析 (CCPD) は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査