

表 244 2014年死亡患者(透析歴、原疾患)

原疾患	3ヶ月未満	3ヶ月～	6ヶ月～	1 年 ～	2 年 ～	5 年 ～	10年～	15年～	20年～	25年～	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎 (%)	204 (13.5)	144 (13.3)	246 (16.0)	478 (17.9)	1,279 (18.2)	1,670 (20.5)	1,107 (28.8)		1,190 (47.3)	798 (70.1)	7,116 (24.2)	3 (11.5)	23 (32.4)	7,142 (24.2)
慢性腎盂腎炎 (%)	17 (1.1)	10 (0.9)	18 (1.2)	18 (0.7)	38 (0.5)	52 (0.6)	30 (0.8)		46 (1.8)	13 (1.1)	242 (0.8)		1 (1.4)	243 (0.8)
急速進行性糸球 体腎炎 (%)	84 (5.6)	28 (2.6)	24 (1.6)	35 (1.3)	74 (1.1)	66 (0.8)	15 (0.4)		10 (0.4)	4 (0.4)	340 (1.2)			340 (1.2)
妊娠腎/妊娠中毒 症 (%)			1 (0.1)	1 (0.0)	4 (0.1)	7 (0.1)	9 (0.2)		16 (0.6)	29 (2.5)	67 (0.2)		1 (1.4)	68 (0.2)
その他の分類不 能の腎炎 (%)	10 (0.7)	3 (0.3)	6 (0.4)	3 (0.1)	15 (0.2)	20 (0.2)	12 (0.3)		7 (0.3)	5 (0.4)	81 (0.3)		1 (1.4)	82 (0.3)
多発性嚢胞腎 (%)	14 (0.9)	10 (0.9)	21 (1.4)	28 (1.1)	111 (1.6)	130 (1.6)	110 (2.9)		114 (4.5)	42 (3.7)	580 (2.0)		1 (1.4)	581 (2.0)
腎硬化症 (%)	180 (11.9)	175 (16.1)	237 (15.4)	374 (14.0)	977 (13.9)	808 (9.9)	298 (7.8)		120 (4.8)	17 (1.5)	3,186 (10.8)		6 (8.5)	3,192 (10.8)
悪性高血圧 (%)	10 (0.7)	2 (0.2)	10 (0.6)	20 (0.8)	43 (0.6)	48 (0.6)	28 (0.7)		20 (0.8)	4 (0.4)	185 (0.6)			185 (0.6)
糖尿病性腎症 (%)	359 (23.8)	347 (32.0)	545 (35.4)	1,143 (42.9)	3,204 (45.7)	4,072 (50.1)	1,678 (43.7)		612 (24.3)	42 (3.7)	12,002 (40.8)	4 (15.4)	23 (32.4)	12,029 (40.7)
SLE腎炎 (%)	23 (1.5)	9 (0.8)	15 (1.0)	12 (0.5)	44 (0.6)	61 (0.8)	19 (0.5)		28 (1.1)	10 (0.9)	221 (0.8)			221 (0.7)
アミロイド腎 (%)	9 (0.6)	8 (0.7)	12 (0.8)	7 (0.3)	18 (0.3)	17 (0.2)	5 (0.1)		3 (0.1)		79 (0.3)			79 (0.3)
痛風腎 (%)	2 (0.1)		1 (0.1)	3 (0.1)	11 (0.2)	16 (0.2)	13 (0.3)		15 (0.6)	7 (0.6)	68 (0.2)	1 (3.8)		69 (0.2)
先天性代謝異常 による腎不全 (%)					3 (0.0)	1 (0.0)	2 (0.1)		1 (0.0)	1 (0.1)	8 (0.0)			8 (0.0)
腎・尿路結核 (%)	1 (0.1)		2 (0.1)	1 (0.0)	4 (0.1)	4 (0.0)	5 (0.1)		7 (0.3)	4 (0.4)	28 (0.1)			28 (0.1)
腎・尿路結石 (%)	2 (0.1)	3 (0.3)	2 (0.1)	7 (0.3)	14 (0.2)	16 (0.2)	8 (0.2)		5 (0.2)	3 (0.3)	60 (0.2)			60 (0.2)
腎・尿路腫瘍 (%)	19 (1.3)	11 (1.0)	16 (1.0)	16 (0.6)	44 (0.6)	19 (0.2)	10 (0.3)		7 (0.3)	1 (0.1)	143 (0.5)	1 (3.8)	1 (1.4)	145 (0.5)
閉塞性尿路障害 (%)	14 (0.9)	5 (0.5)	3 (0.2)	7 (0.3)	12 (0.2)	23 (0.3)	9 (0.2)		5 (0.2)	2 (0.2)	80 (0.3)			80 (0.3)
骨髄腫 (%)	24 (1.6)	24 (2.2)	23 (1.5)	14 (0.5)	15 (0.2)	8 (0.1)	2 (0.1)				110 (0.4)		1 (1.4)	111 (0.4)
腎形成不全 (%)	1 (0.1)	2 (0.2)	1 (0.1)		3 (0.0)	1 (0.0)	5 (0.1)		1 (0.0)	3 (0.3)	17 (0.1)			17 (0.1)
不明 (%)	344 (22.8)	198 (18.2)	254 (16.5)	382 (14.3)	885 (12.6)	902 (11.1)	386 (10.1)		240 (9.5)	123 (10.8)	3,714 (12.6)	15 (57.7)	11 (15.5)	3,740 (12.7)
再導入 (%)	11 (0.7)	8 (0.7)	6 (0.4)	11 (0.4)	19 (0.3)	22 (0.3)	6 (0.2)		10 (0.4)	9 (0.8)	102 (0.3)			102 (0.3)
その他 (%)	180 (11.9)	98 (9.0)	97 (6.3)	103 (3.9)	193 (2.8)	166 (2.0)	82 (2.1)		58 (2.3)	22 (1.9)	999 (3.4)	2 (7.7)	2 (2.8)	1,003 (3.4)
合計 (%)	1,508 (100.0)	1,085 (100.0)	1,540 (100.0)	2,663 (100.0)	7,010 (100.0)	8,129 (100.0)	3,839 (100.0)		2,515 (100.0)	1,139 (100.0)	29,428 (100.0)	26 (100.0)	71 (100.0)	29,525 (100.0)
記載なし														
総計	1,508	1,085	1,540	2,663	7,010	8,129	3,839		2,515	1,139	29,428	26	71	29,525

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
 (C)Japanese Society for Dialysis Therapy
 2014年調査