

表 245 2014年死亡患者(男性 年齢、原疾患)

原疾患	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)			1 (50.0)	1 (50.0)			1 (6.3)	7 (14.6)	35 (32.7)	35 (16.2)	80 (20.2)	146 (22.3)	328 (22.5)	508 (21.7)	699 (22.7)	854 (23.1)	850 (23.3)	582 (24.5)	217 (26.4)	40 (24.8)	4,384 (23.0)			4,384 (23.0)	75.42	10.41
慢性腎盂腎炎 (%)									1 (0.9)	1 (0.5)	2 (0.5)	6 (0.9)	7 (0.5)	10 (0.4)	18 (0.6)	20 (0.5)	29 (0.8)	17 (0.7)	5 (0.6)	2 (1.2)	118 (0.6)			118 (0.6)	76.21	10.71
急速進行性糸球体腎炎 (%)							2 (12.5)	1 (2.1)			3 (0.8)	4 (0.6)	7 (0.5)	16 (0.7)	32 (1.0)	50 (1.4)	38 (1.0)	28 (1.2)	4 (0.5)	1 (0.6)	186 (1.0)			186 (1.0)	76.20	10.01
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)														1 (0.0)	2 (0.1)						3 (0.0)			3 (0.0)	70.67	3.51
その他の分類不能の腎炎 (%)								1 (2.1)		2 (0.9)	2 (0.5)		4 (0.3)	4 (0.2)	4 (0.1)	10 (0.3)	11 (0.3)	2 (0.1)	2 (0.2)		42 (0.2)			42 (0.2)	73.07	12.14
多発性囊胞腎 (%)								1 (2.1)	1 (0.9)	2 (0.9)	12 (3.0)	20 (3.1)	35 (2.4)	42 (1.8)	48 (1.6)	49 (1.3)	54 (1.5)	44 (1.9)	10 (1.2)	3 (1.9)	321 (1.7)			321 (1.7)	73.55	10.89
腎硬化症 (%)					1 (50.0)		1 (6.3)		2 (1.9)	13 (6.0)	6 (1.5)	29 (4.4)	58 (4.0)	118 (5.0)	243 (7.9)	369 (10.0)	514 (14.1)	465 (19.6)	208 (25.3)	47 (29.2)	2,074 (10.9)			2,074 (10.9)	80.28	8.97
悪性高血圧 (%)							1 (6.3)		2 (1.9)	4 (1.9)	1 (0.3)	7 (1.1)	1 (0.1)	11 (0.5)	20 (0.6)	28 (0.8)	19 (0.5)	21 (0.9)	11 (1.3)	1 (0.6)	127 (0.7)			127 (0.7)	76.06	12.28
糖尿病性腎症 (%)		1 (100.0)					4 (25.0)	20 (41.7)	45 (42.1)	120 (55.6)	215 (54.2)	335 (51.2)	789 (54.2)	1,271 (54.3)	1,539 (49.9)	1,619 (43.8)	1,422 (38.9)	691 (29.1)	192 (23.4)	30 (18.6)	8,293 (43.6)			8,293 (43.6)	73.03	10.03
SLE腎炎 (%)								1 (2.1)	1 (0.9)		2 (0.5)	4 (0.6)	6 (0.4)	13 (0.6)	16 (0.5)	13 (0.4)	11 (0.3)	9 (0.4)	1 (0.1)	1 (0.6)	78 (0.4)			78 (0.4)	72.99	10.76
アミロイド腎 (%)								1 (2.1)			1 (0.3)	1 (0.2)	2 (0.1)	3 (0.1)	4 (0.1)	7 (0.2)	5 (0.1)	1 (0.0)			25 (0.1)			25 (0.1)	71.80	11.03
痛風腎 (%)												3 (0.5)	3 (0.2)	10 (0.4)	10 (0.3)	10 (0.3)	15 (0.4)	5 (0.2)	5 (0.6)		61 (0.3)			61 (0.3)	75.97	9.03
先天性代謝異常による腎不全 (%)											2 (0.5)	1 (0.2)						2 (0.1)			5 (0.0)			5 (0.0)	66.00	17.69
腎・尿路結核 (%)														3 (0.1)	3 (0.1)	1 (0.0)	4 (0.1)	2 (0.1)			13 (0.1)			13 (0.1)	77.31	8.22
腎・尿路結石 (%)										1 (0.5)			1 (0.1)	6 (0.3)	2 (0.1)	6 (0.2)	11 (0.3)	10 (0.4)	2 (0.2)		39 (0.2)			39 (0.2)	78.85	9.11
腎・尿路腫瘍 (%)								2 (4.2)	3 (2.8)	2 (0.9)		1 (0.2)	5 (0.3)	9 (0.4)	16 (0.5)	26 (0.7)	29 (0.8)	16 (0.7)	5 (0.6)	2 (1.2)	116 (0.6)			116 (0.6)	76.17	11.51
閉塞性尿路障害 (%)						1 (50.0)	1 (6.3)			1 (0.5)	2 (0.5)	1 (0.2)	1 (0.1)	7 (0.3)	9 (0.3)	10 (0.3)	5 (0.1)	14 (0.6)	3 (0.4)	1 (0.6)	57 (0.3)			57 (0.3)	74.91	13.83
骨髄腫 (%)									1 (0.9)		4 (1.0)	1 (0.2)	8 (0.5)	11 (0.5)	10 (0.3)	14 (0.4)	10 (0.3)	9 (0.4)	3 (0.4)		71 (0.4)			71 (0.4)	73.14	10.66
腎形成不全 (%)								1 (2.1)			1 (0.3)			1 (0.0)							3 (0.0)			3 (0.0)	53.33	15.50
不明 (%)	1 (100.0)						1 (6.3)	7 (14.6)	8 (7.5)	19 (8.8)	42 (10.6)	60 (9.2)	141 (9.7)	226 (9.7)	316 (10.2)	466 (12.6)	494 (13.5)	373 (15.7)	140 (17.1)	26 (16.1)	2,320 (12.2)	1 (100.0)		2,321 (12.2)	76.75	10.31
再導入 (%)								1 (2.1)		3 (1.4)	3 (0.8)	10 (1.5)	8 (0.5)	12 (0.5)	8 (0.3)	9 (0.2)	8 (0.2)	7 (0.3)	1 (0.1)		70 (0.4)			70 (0.4)	68.90	11.97
その他 (%)			1 (50.0)			1 (50.0)	5 (31.3)	5 (10.4)	8 (7.5)	13 (6.0)	19 (4.8)	25 (3.8)	50 (3.4)	59 (2.5)	85 (2.8)	132 (3.6)	123 (3.4)	77 (3.2)	12 (1.5)	7 (4.3)	622 (3.3)			622 (3.3)	73.39	12.44
合計 (%)	1 (100.0)	1 (100.0)		2 (100.0)	2 (100.0)	2 (100.0)	16 (100.0)	48 (100.0)	107 (100.0)	216 (100.0)	397 (100.0)	654 (100.0)	1,455 (100.0)	2,341 (100.0)	3,084 (100.0)	3,693 (100.0)	3,652 (100.0)	2,375 (100.0)	821 (100.0)	161 (100.0)	19,028 (100.0)		1 (100.0)	19,029 (100.0)	74.94	10.47
記載なし																										
総計	1	1		2	2	2	16	48	107	216	397	654	1,455	2,341	3,084	3,693	3,652	2,375	821	161	19,028	1		19,029	74.94	10.47

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する％です。
 (C)Japanese Society for Dialysis Therapy
 2014年調査