

表 246 2014年死亡患者(女性 年齢、原疾患)

原疾患	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差	
慢性糸球体腎炎 (%)							2 (22.2)		9 (23.7)	14 (20.0)	28 (19.6)	59 (23.2)	130 (23.4)	248 (26.2)	394 (27.3)	473 (25.1)	573 (26.8)	503 (27.0)	268 (29.0)	57 (28.9)	2,758 (26.3)			2,758 (26.3)	78.46	9.94	
慢性腎盂腎炎 (%)								1 (5.3)		2 (2.9)		4 (1.6)	9 (1.6)	13 (1.4)	16 (1.1)	20 (1.1)	28 (1.3)	24 (1.3)	7 (0.8)	1 (0.5)	125 (1.2)			125 (1.2)	77.10	10.69	
急速進行性糸球 体腎炎 (%)						1 (33.3)					1 (0.7)	2 (0.8)	2 (0.4)	8 (0.8)	28 (1.9)	20 (1.1)	39 (1.8)	39 (2.1)	11 (1.2)	3 (1.5)	154 (1.5)			154 (1.5)	79.84	9.22	
妊娠腎/妊娠中毒 症 (%)										1 (1.4)	6 (0.7)	10 (2.4)	8 (1.8)	17 (0.8)	9 (1.2)	10 (0.5)	3 (0.5)				65 (0.6)			65 (0.6)	70.72	8.69	
その他の分類不能 の腎炎 (%)										2 (1.4)	1 (0.4)	4 (0.7)	4 (0.4)	3 (0.2)	11 (0.6)	7 (0.3)	4 (0.2)	4 (0.4)			40 (0.4)			40 (0.4)	76.10	10.54	
多発性囊胞腎 (%)										1 (1.4)	4 (2.8)	10 (3.9)	22 (4.0)	39 (4.1)	42 (2.9)	59 (3.1)	42 (2.0)	27 (1.4)	13 (0.5)	1 (0.5)	260 (2.5)			260 (2.5)	74.68	9.42	
腎硬化症 (%)				1 (50.0)	1 (33.3)				2 (5.3)		3 (2.1)	9 (3.5)	17 (3.1)	33 (3.5)	81 (5.6)	156 (8.3)	261 (12.2)	315 (16.9)	196 (21.2)	43 (21.8)	1,118 (10.7)			1,118 (10.7)	83.13	8.46	
悪性高血圧 (%)											1 (0.7)	3 (1.2)	3 (0.5)	3 (0.3)	6 (0.4)	8 (0.4)	14 (0.7)	9 (0.5)	4 (0.4)	7 (3.6)	58 (0.6)			58 (0.6)	79.93	11.60	
糖尿病性腎症 (%)					1 (33.3)		2 (22.2)	10 (52.6)	17 (44.7)	34 (48.6)	66 (46.2)	101 (39.8)	231 (41.6)	410 (43.3)	587 (40.7)	756 (40.1)	730 (34.2)	556 (29.8)	205 (22.2)	30 (15.2)	3,736 (35.6)			3,736 (35.6)	76.05	10.15	
SLE腎炎 (%)							1 (11.1)	2 (10.5)	4 (10.5)	1 (1.4)	9 (6.3)	13 (5.1)	22 (4.0)	13 (1.4)	27 (1.9)	22 (1.2)	15 (0.7)	8 (0.4)	4 (0.4)	1 (0.5)	142 (1.4)	1 (50.0)		142 (1.4)	69.06	12.63	
アミロイド腎 (%)									1 (2.6)	1 (1.4)		2 (0.8)	9 (1.6)	10 (1.1)	8 (0.6)	12 (0.6)	10 (0.5)	1 (0.1)			54 (0.5)			54 (0.5)	71.00	9.29	
痛風腎 (%)														1 (0.1)		3 (0.2)	1 (0.0)	3 (0.2)			8 (0.1)			8 (0.1)	80.25	8.00	
先天性代謝異常 による腎不全 (%)				1 (50.0)									1 (0.2)						1 (0.5)	3 (0.0)				3 (0.0)	58.33	39.80	
腎・尿路結核 (%)														3 (0.3)	1 (0.1)	1 (0.1)	6 (0.3)	1 (0.1)	3 (0.3)		15 (0.1)			15 (0.1)	80.27	8.62	
腎・尿路結石 (%)										1 (1.4)			1 (0.2)	5 (0.5)	3 (0.2)	3 (0.2)	4 (0.2)	3 (0.1)	1 (0.2)		21 (0.2)			21 (0.2)	74.81	10.21	
腎・尿路腫瘍 (%)											1 (0.7)	1 (0.4)		1 (0.1)	3 (0.2)	5 (0.3)	9 (0.4)	5 (0.3)	3 (0.3)	1 (0.5)	29 (0.3)			29 (0.3)	79.83	9.74	
閉塞性尿路障害 (%)								1 (2.6)	1 (1.4)			3 (1.2)		1 (0.1)	2 (0.1)	5 (0.3)	5 (0.2)	1 (0.1)	4 (0.4)		23 (0.2)			23 (0.2)	74.87	14.29	
骨髄腫 (%)					1 (33.3)						2 (1.4)		5 (0.9)	2 (0.2)	6 (0.4)	12 (0.6)	8 (0.4)	4 (0.2)			40 (0.4)			40 (0.4)	73.72	12.17	
腎形成不全 (%)		1 (100.0)				1 (33.3)	1 (11.1)	1 (5.3)		1 (1.4)	2 (1.4)		1 (0.2)		2 (0.1)	1 (0.1)	1 (0.0)	1 (0.1)	1 (0.1)		14 (0.1)			14 (0.1)	57.29	25.28	
不明 (%)							1 (11.1)	2 (10.5)		7 (10.0)	14 (9.8)	30 (11.8)	59 (10.6)	108 (11.4)	153 (10.6)	234 (12.4)	297 (13.9)	294 (15.8)	171 (18.5)	48 (24.4)	1,418 (13.5)	1 (50.0)		1,419 (13.5)	79.76	10.00	
再導入 (%)						1 (33.3)		1 (5.3)		1 (1.4)	3 (2.1)	4 (1.6)	3 (0.5)	4 (0.4)	5 (0.3)	3 (0.2)	2 (0.1)	5 (0.3)			32 (0.3)			32 (0.3)	66.94	15.11	
その他 (%)							2 (22.2)	2 (10.5)	4 (10.5)	5 (7.1)	6 (4.2)	6 (2.4)	26 (4.7)	32 (3.4)	58 (4.0)	73 (3.9)	75 (3.5)	58 (3.1)	30 (3.2)	4 (2.0)	381 (3.6)			381 (3.6)	76.39	11.39	
合計 (%)		1 (100.0)		2 (100.0)	3 (100.0)	3 (100.0)	9 (100.0)	19 (100.0)	38 (100.0)	70 (100.0)	143 (100.0)	254 (100.0)	555 (100.0)	946 (100.0)	1,442 (100.0)	1,886 (100.0)	2,137 (100.0)	1,864 (100.0)	925 (100.0)	197 (100.0)	10,494 (100.0)	2 (100.0)			10,496 (100.0)	77.80	10.42
記載なし																											
総計		1		2	3	3	9	19	38	70	143	254	555	946	1,442	1,886	2,137	1,864	925	197	10,494	2		10,496	77.80	10.42	

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査