

表 251 2014年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	4,800	2,975	7,775		7,775
(%)	(25.2)	(28.3)	(26.3)		(26.3)
脳血管障害	1,329	769	2,098		2,098
(%)	(7.0)	(7.3)	(7.1)		(7.1)
感染症	4,066	2,096	6,162		6,162
(%)	(21.4)	(20.0)	(20.9)		(20.9)
消化管出血	280	191	471		471
(%)	(1.5)	(1.8)	(1.6)		(1.6)
悪性腫瘍	1,951	718	2,669		2,669
(%)	(10.3)	(6.8)	(9.0)		(9.0)
悪液質/尿毒症	652	518	1,170		1,170
(%)	(3.4)	(4.9)	(4.0)		(4.0)
心筋梗塞	868	390	1,258		1,258
(%)	(4.6)	(3.7)	(4.3)		(4.3)
カリウム中毒/頓死	551	243	794		794
(%)	(2.9)	(2.3)	(2.7)		(2.7)
肝硬変症	206	72	278		278
(%)	(1.1)	(0.7)	(0.9)		(0.9)
自殺/拒否	166	49	215		215
(%)	(0.9)	(0.5)	(0.7)		(0.7)
腸閉塞	181	129	310		310
(%)	(1.0)	(1.2)	(1.0)		(1.0)
肺血栓/肺塞栓	55	24	79		79
(%)	(0.3)	(0.2)	(0.3)		(0.3)
災害・事故死	112	45	157		157
(%)	(0.6)	(0.4)	(0.5)		(0.5)
その他	1,603	1,147	2,750		2,750
(%)	(8.4)	(10.9)	(9.3)		(9.3)
不明	2,209	1,130	3,339		3,339
(%)	(11.6)	(10.8)	(11.3)		(11.3)
合計	19,029	10,496	29,525		29,525
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	19,029	10,496	29,525		29,525

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査