

表 252 2014年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(北海道)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	313 (%) (32.7)	180 (34.5)	493 (33.3)		493 (33.3)
脳血管障害	65 (%) (6.8)	33 (6.3)	98 (6.6)		98 (6.6)
感染症	162 (%) (16.9)	84 (16.1)	246 (16.6)		246 (16.6)
消化管出血	15 (%) (1.6)	7 (1.3)	22 (1.5)		22 (1.5)
悪性腫瘍	83 (%) (8.7)	35 (6.7)	118 (8.0)		118 (8.0)
悪液質/尿毒症	44 (%) (4.6)	33 (6.3)	77 (5.2)		77 (5.2)
心筋梗塞	24 (%) (2.5)	12 (2.3)	36 (2.4)		36 (2.4)
カリウム中毒/頓死	33 (%) (3.4)	16 (3.1)	49 (3.3)		49 (3.3)
肝硬変症	10 (%) (1.0)	1 (0.2)	11 (0.7)		11 (0.7)
自殺/拒否	8 (%) (0.8)	2 (0.4)	10 (0.7)		10 (0.7)
腸閉塞	8 (%) (0.8)	9 (1.7)	17 (1.1)		17 (1.1)
肺血栓/肺塞栓	3 (%) (0.3)	1 (0.2)	4 (0.3)		4 (0.3)
災害・事故死	1 (%) (0.1)	2 (0.4)	3 (0.2)		3 (0.2)
その他	73 (%) (7.6)	48 (9.2)	121 (8.2)		121 (8.2)
不明	116 (%) (12.1)	59 (11.3)	175 (11.8)		175 (11.8)
合計	958 (%) (100.0)	522 (100.0)	1,480 (100.0)		1,480 (100.0)
記載なし					
総計	958	522	1,480		1,480

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査