

表 253 2014年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(青森県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	72	52	124		124
(%)	(28.6)	(33.8)	(30.5)		(30.5)
脳血管障害	25	9	34		34
(%)	(9.9)	(5.8)	(8.4)		(8.4)
感染症	34	17	51		51
(%)	(13.5)	(11.0)	(12.6)		(12.6)
消化管出血	2	4	6		6
(%)	(0.8)	(2.6)	(1.5)		(1.5)
悪性腫瘍	25	13	38		38
(%)	(9.9)	(8.4)	(9.4)		(9.4)
悪液質/尿毒症	5	6	11		11
(%)	(2.0)	(3.9)	(2.7)		(2.7)
心筋梗塞	15	8	23		23
(%)	(6.0)	(5.2)	(5.7)		(5.7)
カリウム中毒/頓死	6	4	10		10
(%)	(2.4)	(2.6)	(2.5)		(2.5)
肝硬変症	3		3		3
(%)	(1.2)		(0.7)		(0.7)
自殺/拒否	2		2		2
(%)	(0.8)		(0.5)		(0.5)
腸閉塞	1		1		1
(%)	(0.4)		(0.2)		(0.2)
肺血栓/肺塞栓	1		1		1
(%)	(0.4)		(0.2)		(0.2)
災害・事故死	1		1		1
(%)	(0.4)		(0.2)		(0.2)
その他	26	21	47		47
(%)	(10.3)	(13.6)	(11.6)		(11.6)
不明	34	20	54		54
(%)	(13.5)	(13.0)	(13.3)		(13.3)
合計	252	154	406		406
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	252	154	406		406

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査