

表 255 2014年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(宮城県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	69 (%) (23.5)	29 (18.0)	98 (21.6)		98 (21.6)
脳血管障害	21 (%) (7.2)	14 (8.7)	35 (7.7)		35 (7.7)
感染症	69 (%) (23.5)	32 (19.9)	101 (22.2)		101 (22.2)
消化管出血	6 (%) (2.0)	6 (3.7)	12 (2.6)		12 (2.6)
悪性腫瘍	26 (%) (8.9)	13 (8.1)	39 (8.6)		39 (8.6)
悪液質/尿毒症	7 (%) (2.4)	9 (5.6)	16 (3.5)		16 (3.5)
心筋梗塞	7 (%) (2.4)	5 (3.1)	12 (2.6)		12 (2.6)
カリウム中毒/頓死	6 (%) (2.0)	3 (1.9)	9 (2.0)		9 (2.0)
肝硬変症	3 (%) (1.0)		3 (0.7)		3 (0.7)
自殺/拒否	2 (%) (0.7)	2 (1.2)	4 (0.9)		4 (0.9)
腸閉塞	5 (%) (1.7)	2 (1.2)	7 (1.5)		7 (1.5)
肺血栓/肺塞栓	2 (%) (0.7)	1 (0.6)	3 (0.7)		3 (0.7)
災害・事故死	3 (%) (1.0)	2 (1.2)	5 (1.1)		5 (1.1)
その他	37 (%) (12.6)	29 (18.0)	66 (14.5)		66 (14.5)
不明	30 (%) (10.2)	14 (8.7)	44 (9.7)		44 (9.7)
合計	293 (%) (100.0)	161 (100.0)	454 (100.0)		454 (100.0)
記載なし					
総計	293	161	454		454

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査