

表 256 2014年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(秋田県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	54	30	84		84
(%)	(32.7)	(32.6)	(32.7)		(32.7)
脳血管障害	24	11	35		35
(%)	(14.5)	(12.0)	(13.6)		(13.6)
感染症	29	18	47		47
(%)	(17.6)	(19.6)	(18.3)		(18.3)
消化管出血	3	1	4		4
(%)	(1.8)	(1.1)	(1.6)		(1.6)
悪性腫瘍	11	7	18		18
(%)	(6.7)	(7.6)	(7.0)		(7.0)
悪液質/尿毒症	5	3	8		8
(%)	(3.0)	(3.3)	(3.1)		(3.1)
心筋梗塞	5	1	6		6
(%)	(3.0)	(1.1)	(2.3)		(2.3)
カリウム中毒/頓死	6		6		6
(%)	(3.6)		(2.3)		(2.3)
肝硬変症	1	1	2		2
(%)	(0.6)	(1.1)	(0.8)		(0.8)
自殺/拒否	1		1		1
(%)	(0.6)		(0.4)		(0.4)
腸閉塞	3		3		3
(%)	(1.8)		(1.2)		(1.2)
肺血栓/肺塞栓					
(%)					
災害・事故死	1		1		1
(%)	(0.6)		(0.4)		(0.4)
その他	9	5	14		14
(%)	(5.5)	(5.4)	(5.4)		(5.4)
不明	13	15	28		28
(%)	(7.9)	(16.3)	(10.9)		(10.9)
合計	165	92	257		257
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	165	92	257		257

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査