

表 257 2014年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(山形県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	29	10	39		39
(%)	(18.0)	(9.8)	(14.8)		(14.8)
脳血管障害	4	6	10		10
(%)	(2.5)	(5.9)	(3.8)		(3.8)
感染症	27	12	39		39
(%)	(16.8)	(11.8)	(14.8)		(14.8)
消化管出血	1	1	2		2
(%)	(0.6)	(1.0)	(0.8)		(0.8)
悪性腫瘍	18	8	26		26
(%)	(11.2)	(7.8)	(9.9)		(9.9)
悪液質/尿毒症	10	9	19		19
(%)	(6.2)	(8.8)	(7.2)		(7.2)
心筋梗塞	10	2	12		12
(%)	(6.2)	(2.0)	(4.6)		(4.6)
カリウム中毒/頓死	2	5	7		7
(%)	(1.2)	(4.9)	(2.7)		(2.7)
肝硬変症	2	3	5		5
(%)	(1.2)	(2.9)	(1.9)		(1.9)
自殺/拒否	2	1	3		3
(%)	(1.2)	(1.0)	(1.1)		(1.1)
腸閉塞	1	2	3		3
(%)	(0.6)	(2.0)	(1.1)		(1.1)
肺血栓/肺塞栓					
(%)					
災害・事故死		1	1		1
(%)		(1.0)	(0.4)		(0.4)
その他	28	30	58		58
(%)	(17.4)	(29.4)	(22.1)		(22.1)
不明	27	12	39		39
(%)	(16.8)	(11.8)	(14.8)		(14.8)
合計	161	102	263		263
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	161	102	263		263

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査