

表 259 2014年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(茨城県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	163 (%)	91 (34.9)	254 (36.5)		254 (36.5)
脳血管障害	29 (%)	15 (6.7)	44 (6.3)		44 (6.3)
感染症	81 (%)	49 (18.6)	130 (18.7)		130 (18.7)
消化管出血	4 (%)	3 (0.9)	7 (1.0)		7 (1.0)
悪性腫瘍	37 (%)	12 (8.5)	49 (7.0)		49 (7.0)
悪液質/尿毒症	10 (%)	10 (2.3)	20 (2.9)		20 (2.9)
心筋梗塞	25 (%)	11 (5.7)	36 (5.2)		36 (5.2)
カリウム中毒/頓死	9 (%)	10 (2.1)	19 (3.8)		19 (2.7)
肝硬変症	4 (%)	5 (0.9)	9 (1.9)		9 (1.3)
自殺/拒否	3 (%)	1 (0.7)	4 (0.4)		4 (0.6)
腸閉塞	3 (%)	3 (0.7)	6 (1.1)		6 (0.9)
肺血栓/肺塞栓	1 (%)		1 (0.1)		1 (0.1)
災害・事故死		3 (1.1)	3 (0.4)		3 (0.4)
その他	30 (%)	20 (6.9)	50 (7.7)		50 (7.2)
不明	36 (%)	28 (8.3)	64 (10.7)		64 (9.2)
合計	435 (%)	261 (100.0)	696 (100.0)		696 (100.0)
記載なし					
総計	435	261	696		696

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査