

表 260 2014年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(栃木県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	99 (%) (26.8)	46 (%) (25.7)	145 (%) (26.4)		145 (%) (26.4)
脳血管障害	29 (%) (7.8)	15 (%) (8.4)	44 (%) (8.0)		44 (%) (8.0)
感染症	66 (%) (17.8)	37 (%) (20.7)	103 (%) (18.8)		103 (%) (18.8)
消化管出血	7 (%) (1.9)	4 (%) (2.2)	11 (%) (2.0)		11 (%) (2.0)
悪性腫瘍	42 (%) (11.4)	19 (%) (10.6)	61 (%) (11.1)		61 (%) (11.1)
悪液質/尿毒症	18 (%) (4.9)	12 (%) (6.7)	30 (%) (5.5)		30 (%) (5.5)
心筋梗塞	36 (%) (9.7)	12 (%) (6.7)	48 (%) (8.7)		48 (%) (8.7)
カリウム中毒/頓死	7 (%) (1.9)	1 (%) (0.6)	8 (%) (1.5)		8 (%) (1.5)
肝硬変症	6 (%) (1.6)	4 (%) (2.2)	10 (%) (1.8)		10 (%) (1.8)
自殺/拒否	3 (%) (0.8)	1 (%) (0.6)	4 (%) (0.7)		4 (%) (0.7)
腸閉塞	2 (%) (0.5)	1 (%) (0.6)	3 (%) (0.5)		3 (%) (0.5)
肺血栓/肺塞栓	2 (%) (0.5)		2 (%) (0.4)		2 (%) (0.4)
災害・事故死	1 (%) (0.3)		1 (%) (0.2)		1 (%) (0.2)
その他	27 (%) (7.3)	11 (%) (6.1)	38 (%) (6.9)		38 (%) (6.9)
不明	25 (%) (6.8)	16 (%) (8.9)	41 (%) (7.5)		41 (%) (7.5)
合計	370 (%) (100.0)	179 (%) (100.0)	549 (%) (100.0)		549 (%) (100.0)
記載なし					
総計	370	179	549		549

数値下の括弧内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査