

表 262 2014年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(埼玉県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	284	125	409		409
(%)	(29.5)	(27.4)	(28.8)		(28.8)
脳血管障害	63	38	101		101
(%)	(6.5)	(8.3)	(7.1)		(7.1)
感染症	167	88	255		255
(%)	(17.3)	(19.3)	(17.9)		(17.9)
消化管出血	18	12	30		30
(%)	(1.9)	(2.6)	(2.1)		(2.1)
悪性腫瘍	97	27	124		124
(%)	(10.1)	(5.9)	(8.7)		(8.7)
悪液質/尿毒症	19	16	35		35
(%)	(2.0)	(3.5)	(2.5)		(2.5)
心筋梗塞	62	25	87		87
(%)	(6.4)	(5.5)	(6.1)		(6.1)
カリウム中毒/頓死	15	8	23		23
(%)	(1.6)	(1.8)	(1.6)		(1.6)
肝硬変症	6	5	11		11
(%)	(0.6)	(1.1)	(0.8)		(0.8)
自殺/拒否	16	2	18		18
(%)	(1.7)	(0.4)	(1.3)		(1.3)
腸閉塞	6	7	13		13
(%)	(0.6)	(1.5)	(0.9)		(0.9)
肺血栓/肺塞栓		3	3		3
(%)		(0.7)	(0.2)		(0.2)
災害・事故死	5	1	6		6
(%)	(0.5)	(0.2)	(0.4)		(0.4)
その他	58	45	103		103
(%)	(6.0)	(9.8)	(7.2)		(7.2)
不明	148	55	203		203
(%)	(15.4)	(12.0)	(14.3)		(14.3)
合計	964	457	1,421		1,421
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	964	457	1,421		1,421

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査