

表 263 2014年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(千葉県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	206	98	304		304
(%)	(23.5)	(21.6)	(22.9)		(22.9)
脳血管障害	73	39	112		112
(%)	(8.3)	(8.6)	(8.4)		(8.4)
感染症	156	81	237		237
(%)	(17.8)	(17.9)	(17.8)		(17.8)
消化管出血	16	12	28		28
(%)	(1.8)	(2.6)	(2.1)		(2.1)
悪性腫瘍	80	37	117		117
(%)	(9.1)	(8.2)	(8.8)		(8.8)
悪液質/尿毒症	26	20	46		46
(%)	(3.0)	(4.4)	(3.5)		(3.5)
心筋梗塞	39	12	51		51
(%)	(4.5)	(2.6)	(3.8)		(3.8)
カリウム中毒/頓死	30	15	45		45
(%)	(3.4)	(3.3)	(3.4)		(3.4)
肝硬変症	10	1	11		11
(%)	(1.1)	(0.2)	(0.8)		(0.8)
自殺/拒否	11	1	12		12
(%)	(1.3)	(0.2)	(0.9)		(0.9)
腸閉塞	5	4	9		9
(%)	(0.6)	(0.9)	(0.7)		(0.7)
肺血栓/肺塞栓	1	1	2		2
(%)	(0.1)	(0.2)	(0.2)		(0.2)
災害・事故死	4	1	5		5
(%)	(0.5)	(0.2)	(0.4)		(0.4)
その他	110	64	174		174
(%)	(12.6)	(14.1)	(13.1)		(13.1)
不明	108	67	175		175
(%)	(12.3)	(14.8)	(13.2)		(13.2)
合計	875	453	1,328		1,328
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	875	453	1,328		1,328

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査