

表 266 2014年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(新潟県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	75	48	123		123
(%)	(23.8)	(30.2)	(25.9)		(25.9)
脳血管障害	29	11	40		40
(%)	(9.2)	(6.9)	(8.4)		(8.4)
感染症	60	34	94		94
(%)	(19.0)	(21.4)	(19.8)		(19.8)
消化管出血	1	3	4		4
(%)	(0.3)	(1.9)	(0.8)		(0.8)
悪性腫瘍	40	7	47		47
(%)	(12.7)	(4.4)	(9.9)		(9.9)
悪液質/尿毒症	22	15	37		37
(%)	(7.0)	(9.4)	(7.8)		(7.8)
心筋梗塞	12	2	14		14
(%)	(3.8)	(1.3)	(3.0)		(3.0)
カリウム中毒/頓死	9	2	11		11
(%)	(2.9)	(1.3)	(2.3)		(2.3)
肝硬変症	6	1	7		7
(%)	(1.9)	(0.6)	(1.5)		(1.5)
自殺/拒否	3	2	5		5
(%)	(1.0)	(1.3)	(1.1)		(1.1)
腸閉塞	3	3	6		6
(%)	(1.0)	(1.9)	(1.3)		(1.3)
肺血栓/肺塞栓	1	1	2		2
(%)	(0.3)	(0.6)	(0.4)		(0.4)
災害・事故死	3	1	4		4
(%)	(1.0)	(0.6)	(0.8)		(0.8)
その他	31	14	45		45
(%)	(9.8)	(8.8)	(9.5)		(9.5)
不明	20	15	35		35
(%)	(6.3)	(9.4)	(7.4)		(7.4)
合計	315	159	474		474
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	315	159	474		474

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査