

表 267 2014年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(富山県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	26 (%) (14.9)	17 (%) (22.1)	43 (%) (17.1)		43 (%) (17.1)
脳血管障害	17 (%) (9.7)	7 (%) (9.1)	24 (%) (9.5)		24 (%) (9.5)
感染症	50 (%) (28.6)	15 (%) (19.5)	65 (%) (25.8)		65 (%) (25.8)
消化管出血	1 (%) (0.6)	4 (%) (5.2)	5 (%) (2.0)		5 (%) (2.0)
悪性腫瘍	22 (%) (12.6)	6 (%) (7.8)	28 (%) (11.1)		28 (%) (11.1)
悪液質/尿毒症	3 (%) (1.7)	1 (%) (1.3)	4 (%) (1.6)		4 (%) (1.6)
心筋梗塞	15 (%) (8.6)	8 (%) (10.4)	23 (%) (9.1)		23 (%) (9.1)
カリウム中毒/頓死	3 (%) (1.7)	1 (%) (1.3)	4 (%) (1.6)		4 (%) (1.6)
肝硬変症	4 (%) (2.3)	1 (%) (1.3)	5 (%) (2.0)		5 (%) (2.0)
自殺/拒否	3 (%) (1.7)	1 (%) (1.3)	4 (%) (1.6)		4 (%) (1.6)
腸閉塞	2 (%) (1.1)	3 (%) (3.9)	5 (%) (2.0)		5 (%) (2.0)
肺血栓/肺塞栓					
災害・事故死	1 (%) (0.6)		1 (%) (0.4)		1 (%) (0.4)
その他	4 (%) (2.3)	8 (%) (10.4)	12 (%) (4.8)		12 (%) (4.8)
不明	24 (%) (13.7)	5 (%) (6.5)	29 (%) (11.5)		29 (%) (11.5)
合計	175 (%) (100.0)	77 (%) (100.0)	252 (%) (100.0)		252 (%) (100.0)
記載なし					
総計	175	77	252		252

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査