

表 268 2014年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(石川県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	43	24	67		67
(%)	(24.3)	(24.5)	(24.4)		(24.4)
脳血管障害	12	9	21		21
(%)	(6.8)	(9.2)	(7.6)		(7.6)
感染症	50	28	78		78
(%)	(28.2)	(28.6)	(28.4)		(28.4)
消化管出血		1	1		1
(%)		(1.0)	(0.4)		(0.4)
悪性腫瘍	20	5	25		25
(%)	(11.3)	(5.1)	(9.1)		(9.1)
悪液質/尿毒症	9	2	11		11
(%)	(5.1)	(2.0)	(4.0)		(4.0)
心筋梗塞	5	3	8		8
(%)	(2.8)	(3.1)	(2.9)		(2.9)
カリウム中毒/頓死	6	4	10		10
(%)	(3.4)	(4.1)	(3.6)		(3.6)
肝硬変症	2		2		2
(%)	(1.1)		(0.7)		(0.7)
自殺/拒否	1		1		1
(%)	(0.6)		(0.4)		(0.4)
腸閉塞		1	1		1
(%)		(1.0)	(0.4)		(0.4)
肺血栓/肺塞栓	1	1	2		2
(%)	(0.6)	(1.0)	(0.7)		(0.7)
災害・事故死	1		1		1
(%)	(0.6)		(0.4)		(0.4)
その他	12	14	26		26
(%)	(6.8)	(14.3)	(9.5)		(9.5)
不明	15	6	21		21
(%)	(8.5)	(6.1)	(7.6)		(7.6)
合計	177	98	275		275
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	177	98	275		275

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査