

表 269 2014年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(福井県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	19	20	39		39
(%)	(16.4)	(26.3)	(20.3)		(20.3)
脳血管障害	10	5	15		15
(%)	(8.6)	(6.6)	(7.8)		(7.8)
感染症	38	16	54		54
(%)	(32.8)	(21.1)	(28.1)		(28.1)
消化管出血	2	1	3		3
(%)	(1.7)	(1.3)	(1.6)		(1.6)
悪性腫瘍	13	6	19		19
(%)	(11.2)	(7.9)	(9.9)		(9.9)
悪液質/尿毒症	5	9	14		14
(%)	(4.3)	(11.8)	(7.3)		(7.3)
心筋梗塞	5		5		5
(%)	(4.3)		(2.6)		(2.6)
カリウム中毒/頓死	7	3	10		10
(%)	(6.0)	(3.9)	(5.2)		(5.2)
肝硬変症		1	1		1
(%)		(1.3)	(0.5)		(0.5)
自殺/拒否		2	2		2
(%)		(2.6)	(1.0)		(1.0)
腸閉塞	3		3		3
(%)	(2.6)		(1.6)		(1.6)
肺血栓/肺塞栓					
(%)					
災害・事故死	1		1		1
(%)	(0.9)		(0.5)		(0.5)
その他	11	8	19		19
(%)	(9.5)	(10.5)	(9.9)		(9.9)
不明	2	5	7		7
(%)	(1.7)	(6.6)	(3.6)		(3.6)
合計	116	76	192		192
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	116	76	192		192

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査