

表 270 2014年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(山梨県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	48	25	73		73
(%)	(29.3)	(24.8)	(27.5)		(27.5)
脳血管障害	14	12	26		26
(%)	(8.5)	(11.9)	(9.8)		(9.8)
感染症	37	19	56		56
(%)	(22.6)	(18.8)	(21.1)		(21.1)
消化管出血	2	1	3		3
(%)	(1.2)	(1.0)	(1.1)		(1.1)
悪性腫瘍	19	9	28		28
(%)	(11.6)	(8.9)	(10.6)		(10.6)
悪液質/尿毒症	3	8	11		11
(%)	(1.8)	(7.9)	(4.2)		(4.2)
心筋梗塞	8	3	11		11
(%)	(4.9)	(3.0)	(4.2)		(4.2)
カリウム中毒/頓死	4	2	6		6
(%)	(2.4)	(2.0)	(2.3)		(2.3)
肝硬変症	1	1	2		2
(%)	(0.6)	(1.0)	(0.8)		(0.8)
自殺/拒否	1	2	3		3
(%)	(0.6)	(2.0)	(1.1)		(1.1)
腸閉塞					
(%)					
肺血栓/肺塞栓	1		1		1
(%)	(0.6)		(0.4)		(0.4)
災害・事故死	1	1	2		2
(%)	(0.6)	(1.0)	(0.8)		(0.8)
その他	15	15	30		30
(%)	(9.1)	(14.9)	(11.3)		(11.3)
不明	10	3	13		13
(%)	(6.1)	(3.0)	(4.9)		(4.9)
合計	164	101	265		265
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	164	101	265		265

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査