

表 271 2014年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(長野県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	99 (%) (27.8)	60 (%) (35.1)	159 (%) (30.2)		159 (%) (30.2)
脳血管障害	25 (%) (7.0)	20 (%) (11.7)	45 (%) (8.5)		45 (%) (8.5)
感染症	76 (%) (21.3)	28 (%) (16.4)	104 (%) (19.7)		104 (%) (19.7)
消化管出血	7 (%) (2.0)	2 (%) (1.2)	9 (%) (1.7)		9 (%) (1.7)
悪性腫瘍	33 (%) (9.3)	10 (%) (5.8)	43 (%) (8.2)		43 (%) (8.2)
悪液質/尿毒症	10 (%) (2.8)	8 (%) (4.7)	18 (%) (3.4)		18 (%) (3.4)
心筋梗塞	19 (%) (5.3)	3 (%) (1.8)	22 (%) (4.2)		22 (%) (4.2)
カリウム中毒/頓死	5 (%) (1.4)	3 (%) (1.8)	8 (%) (1.5)		8 (%) (1.5)
肝硬変症	6 (%) (1.7)	2 (%) (1.2)	8 (%) (1.5)		8 (%) (1.5)
自殺/拒否	3 (%) (0.8)		3 (%) (0.6)		3 (%) (0.6)
腸閉塞	3 (%) (0.8)	4 (%) (2.3)	7 (%) (1.3)		7 (%) (1.3)
肺血栓/肺塞栓	1 (%) (0.3)		1 (%) (0.2)		1 (%) (0.2)
災害・事故死	3 (%) (0.8)		3 (%) (0.6)		3 (%) (0.6)
その他	43 (%) (12.1)	20 (%) (11.7)	63 (%) (12.0)		63 (%) (12.0)
不明	23 (%) (6.5)	11 (%) (6.4)	34 (%) (6.5)		34 (%) (6.5)
合計	356 (%) (100.0)	171 (%) (100.0)	527 (%) (100.0)		527 (%) (100.0)
記載なし					
総計	356	171	527		527

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査