

表 272 2014年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(岐阜県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	85	53	138		138
(%)	(27.4)	(33.8)	(29.6)		(29.6)
脳血管障害	21	9	30		30
(%)	(6.8)	(5.7)	(6.4)		(6.4)
感染症	68	26	94		94
(%)	(21.9)	(16.6)	(20.1)		(20.1)
消化管出血	5	4	9		9
(%)	(1.6)	(2.5)	(1.9)		(1.9)
悪性腫瘍	27	13	40		40
(%)	(8.7)	(8.3)	(8.6)		(8.6)
悪液質/尿毒症	14	6	20		20
(%)	(4.5)	(3.8)	(4.3)		(4.3)
心筋梗塞	15	8	23		23
(%)	(4.8)	(5.1)	(4.9)		(4.9)
カリウム中毒/頓死	3		3		3
(%)	(1.0)		(0.6)		(0.6)
肝硬変症	2	1	3		3
(%)	(0.6)	(0.6)	(0.6)		(0.6)
自殺/拒否	5	1	6		6
(%)	(1.6)	(0.6)	(1.3)		(1.3)
腸閉塞	6	1	7		7
(%)	(1.9)	(0.6)	(1.5)		(1.5)
肺血栓/肺塞栓	1		1		1
(%)	(0.3)		(0.2)		(0.2)
災害・事故死	1	1	2		2
(%)	(0.3)	(0.6)	(0.4)		(0.4)
その他	29	20	49		49
(%)	(9.4)	(12.7)	(10.5)		(10.5)
不明	28	14	42		42
(%)	(9.0)	(8.9)	(9.0)		(9.0)
合計	310	157	467		467
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	310	157	467		467

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査