

表 273 2014年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(静岡県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	142	76	218		218
(%)	(25.3)	(27.8)	(26.1)		(26.1)
脳血管障害	30	21	51		51
(%)	(5.3)	(7.7)	(6.1)		(6.1)
感染症	113	64	177		177
(%)	(20.1)	(23.4)	(21.2)		(21.2)
消化管出血	8	4	12		12
(%)	(1.4)	(1.5)	(1.4)		(1.4)
悪性腫瘍	62	17	79		79
(%)	(11.1)	(6.2)	(9.5)		(9.5)
悪液質/尿毒症	25	18	43		43
(%)	(4.5)	(6.6)	(5.2)		(5.2)
心筋梗塞	32	7	39		39
(%)	(5.7)	(2.6)	(4.7)		(4.7)
カリウム中毒/頓死	13	11	24		24
(%)	(2.3)	(4.0)	(2.9)		(2.9)
肝硬変症	6	1	7		7
(%)	(1.1)	(0.4)	(0.8)		(0.8)
自殺/拒否	6		6		6
(%)	(1.1)		(0.7)		(0.7)
腸閉塞	5	1	6		6
(%)	(0.9)	(0.4)	(0.7)		(0.7)
肺血栓/肺塞栓	1	2	3		3
(%)	(0.2)	(0.7)	(0.4)		(0.4)
災害・事故死	5		5		5
(%)	(0.9)		(0.6)		(0.6)
その他	42	22	64		64
(%)	(7.5)	(8.1)	(7.7)		(7.7)
不明	71	29	100		100
(%)	(12.7)	(10.6)	(12.0)		(12.0)
合計	561	273	834		834
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	561	273	834		834

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査