

表 274 2014年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(愛知県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	188 (%) (20.2)	138 (%) (26.7)	326 (%) (22.5)		326 (%) (22.5)
脳血管障害	64 (%) (6.9)	39 (%) (7.6)	103 (%) (7.1)		103 (%) (7.1)
感染症	201 (%) (21.5)	94 (%) (18.2)	295 (%) (20.4)		295 (%) (20.4)
消化管出血	17 (%) (1.8)	8 (%) (1.6)	25 (%) (1.7)		25 (%) (1.7)
悪性腫瘍	105 (%) (11.3)	40 (%) (7.8)	145 (%) (10.0)		145 (%) (10.0)
悪液質/尿毒症	21 (%) (2.3)	15 (%) (2.9)	36 (%) (2.5)		36 (%) (2.5)
心筋梗塞	44 (%) (4.7)	21 (%) (4.1)	65 (%) (4.5)		65 (%) (4.5)
カリウム中毒/頓死	23 (%) (2.5)	10 (%) (1.9)	33 (%) (2.3)		33 (%) (2.3)
肝硬変症	6 (%) (0.6)	1 (%) (0.2)	7 (%) (0.5)		7 (%) (0.5)
自殺/拒否	6 (%) (0.6)	1 (%) (0.2)	7 (%) (0.5)		7 (%) (0.5)
腸閉塞	6 (%) (0.6)	7 (%) (1.4)	13 (%) (0.9)		13 (%) (0.9)
肺血栓/肺塞栓					
(%)					
災害・事故死	1 (%) (0.1)	2 (%) (0.4)	3 (%) (0.2)		3 (%) (0.2)
その他	91 (%) (9.8)	59 (%) (11.4)	150 (%) (10.4)		150 (%) (10.4)
不明	160 (%) (17.1)	81 (%) (15.7)	241 (%) (16.6)		241 (%) (16.6)
合計	933 (%) (100.0)	516 (%) (100.0)	1,449 (%) (100.0)		1,449 (%) (100.0)
記載なし					
総計	933	516	1,449		1,449

数値下の括弧内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査