

表 275 2014年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(三重県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	55	43	98		98
(%)	(21.6)	(33.1)	(25.5)		(25.5)
脳血管障害	18	8	26		26
(%)	(7.1)	(6.2)	(6.8)		(6.8)
感染症	66	32	98		98
(%)	(25.9)	(24.6)	(25.5)		(25.5)
消化管出血	6	2	8		8
(%)	(2.4)	(1.5)	(2.1)		(2.1)
悪性腫瘍	25	8	33		33
(%)	(9.8)	(6.2)	(8.6)		(8.6)
悪液質/尿毒症	12	11	23		23
(%)	(4.7)	(8.5)	(6.0)		(6.0)
心筋梗塞	13	3	16		16
(%)	(5.1)	(2.3)	(4.2)		(4.2)
カリウム中毒/頓死	10	3	13		13
(%)	(3.9)	(2.3)	(3.4)		(3.4)
肝硬変症	3		3		3
(%)	(1.2)		(0.8)		(0.8)
自殺/拒否	2	1	3		3
(%)	(0.8)	(0.8)	(0.8)		(0.8)
腸閉塞	3		3		3
(%)	(1.2)		(0.8)		(0.8)
肺血栓/肺塞栓	2		2		2
(%)	(0.8)		(0.5)		(0.5)
災害・事故死		2	2		2
(%)		(1.5)	(0.5)		(0.5)
その他	23	13	36		36
(%)	(9.0)	(10.0)	(9.4)		(9.4)
不明	17	4	21		21
(%)	(6.7)	(3.1)	(5.5)		(5.5)
合計	255	130	385		385
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	255	130	385		385

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査