

表 276 2014年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(滋賀県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	47	39	86		86
(%)	(27.2)	(36.8)	(30.8)		(30.8)
脳血管障害	16	9	25		25
(%)	(9.2)	(8.5)	(9.0)		(9.0)
感染症	39	18	57		57
(%)	(22.5)	(17.0)	(20.4)		(20.4)
消化管出血	1	1	2		2
(%)	(0.6)	(0.9)	(0.7)		(0.7)
悪性腫瘍	13	8	21		21
(%)	(7.5)	(7.5)	(7.5)		(7.5)
悪液質/尿毒症	6	3	9		9
(%)	(3.5)	(2.8)	(3.2)		(3.2)
心筋梗塞		1	1		1
(%)		(0.9)	(0.4)		(0.4)
カリウム中毒/頓死	8	1	9		9
(%)	(4.6)	(0.9)	(3.2)		(3.2)
肝硬変症	2		2		2
(%)	(1.2)		(0.7)		(0.7)
自殺/拒否		1	1		1
(%)		(0.9)	(0.4)		(0.4)
腸閉塞	2	3	5		5
(%)	(1.2)	(2.8)	(1.8)		(1.8)
肺血栓/肺塞栓					
(%)					
災害・事故死	1		1		1
(%)	(0.6)		(0.4)		(0.4)
その他	18	11	29		29
(%)	(10.4)	(10.4)	(10.4)		(10.4)
不明	20	11	31		31
(%)	(11.6)	(10.4)	(11.1)		(11.1)
合計	173	106	279		279
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	173	106	279		279

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査