

表 278 2014年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(大阪府)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	351	214	565		565
(%)	(24.4)	(26.7)	(25.2)		(25.2)
脳血管障害	69	41	110		110
(%)	(4.8)	(5.1)	(4.9)		(4.9)
感染症	371	208	579		579
(%)	(25.8)	(25.9)	(25.8)		(25.8)
消化管出血	21	16	37		37
(%)	(1.5)	(2.0)	(1.7)		(1.7)
悪性腫瘍	138	56	194		194
(%)	(9.6)	(7.0)	(8.7)		(8.7)
悪液質/尿毒症	31	30	61		61
(%)	(2.2)	(3.7)	(2.7)		(2.7)
心筋梗塞	47	16	63		63
(%)	(3.3)	(2.0)	(2.8)		(2.8)
カリウム中毒/頓死	56	24	80		80
(%)	(3.9)	(3.0)	(3.6)		(3.6)
肝硬変症	14	5	19		19
(%)	(1.0)	(0.6)	(0.8)		(0.8)
自殺/拒否	8	1	9		9
(%)	(0.6)	(0.1)	(0.4)		(0.4)
腸閉塞	12	7	19		19
(%)	(0.8)	(0.9)	(0.8)		(0.8)
肺血栓/肺塞栓	11	4	15		15
(%)	(0.8)	(0.5)	(0.7)		(0.7)
災害・事故死	12	3	15		15
(%)	(0.8)	(0.4)	(0.7)		(0.7)
その他	122	85	207		207
(%)	(8.5)	(10.6)	(9.2)		(9.2)
不明	177	92	269		269
(%)	(12.3)	(11.5)	(12.0)		(12.0)
合計	1,440	802	2,242		2,242
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	1,440	802	2,242		2,242

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査