

表 279 2014年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(兵庫県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	239	165	404		404
(%)	(30.3)	(34.8)	(32.0)		(32.0)
脳血管障害	55	31	86		86
(%)	(7.0)	(6.5)	(6.8)		(6.8)
感染症	161	94	255		255
(%)	(20.4)	(19.8)	(20.2)		(20.2)
消化管出血	19	8	27		27
(%)	(2.4)	(1.7)	(2.1)		(2.1)
悪性腫瘍	68	33	101		101
(%)	(8.6)	(7.0)	(8.0)		(8.0)
悪液質/尿毒症	17	11	28		28
(%)	(2.2)	(2.3)	(2.2)		(2.2)
心筋梗塞	37	17	54		54
(%)	(4.7)	(3.6)	(4.3)		(4.3)
カリウム中毒/頓死	13	5	18		18
(%)	(1.6)	(1.1)	(1.4)		(1.4)
肝硬変症	11	3	14		14
(%)	(1.4)	(0.6)	(1.1)		(1.1)
自殺/拒否	9	4	13		13
(%)	(1.1)	(0.8)	(1.0)		(1.0)
腸閉塞	9	1	10		10
(%)	(1.1)	(0.2)	(0.8)		(0.8)
肺血栓/肺塞栓	1	1	2		2
(%)	(0.1)	(0.2)	(0.2)		(0.2)
災害・事故死	7		7		7
(%)	(0.9)		(0.6)		(0.6)
その他	62	46	108		108
(%)	(7.9)	(9.7)	(8.6)		(8.6)
不明	80	55	135		135
(%)	(10.2)	(11.6)	(10.7)		(10.7)
合計	788	474	1,262		1,262
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	788	474	1,262		1,262

数値下の括弧内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査