

表 280 2014年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(奈良県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	54 (%) (25.4)	35 (%) (29.7)	89 (%) (26.9)		89 (%) (26.9)
脳血管障害	13 (%) (6.1)	6 (%) (5.1)	19 (%) (5.7)		19 (%) (5.7)
感染症	51 (%) (23.9)	25 (%) (21.2)	76 (%) (23.0)		76 (%) (23.0)
消化管出血	4 (%) (1.9)	2 (%) (1.7)	6 (%) (1.8)		6 (%) (1.8)
悪性腫瘍	19 (%) (8.9)	7 (%) (5.9)	26 (%) (7.9)		26 (%) (7.9)
悪液質/尿毒症	10 (%) (4.7)	14 (%) (11.9)	24 (%) (7.3)		24 (%) (7.3)
心筋梗塞	7 (%) (3.3)	7 (%) (5.9)	14 (%) (4.2)		14 (%) (4.2)
カリウム中毒/頓死	7 (%) (3.3)	4 (%) (3.4)	11 (%) (3.3)		11 (%) (3.3)
肝硬変症	5 (%) (2.3)	1 (%) (0.8)	6 (%) (1.8)		6 (%) (1.8)
自殺/拒否	1 (%) (0.5)		1 (%) (0.3)		1 (%) (0.3)
腸閉塞	2 (%) (0.9)	2 (%) (1.7)	4 (%) (1.2)		4 (%) (1.2)
肺血栓/肺塞栓	1 (%) (0.5)		1 (%) (0.3)		1 (%) (0.3)
災害・事故死	1 (%) (0.5)		1 (%) (0.3)		1 (%) (0.3)
その他	12 (%) (5.6)	9 (%) (7.6)	21 (%) (6.3)		21 (%) (6.3)
不明	26 (%) (12.2)	6 (%) (5.1)	32 (%) (9.7)		32 (%) (9.7)
合計	213 (%) (100.0)	118 (%) (100.0)	331 (%) (100.0)		331 (%) (100.0)
記載なし					
総計	213	118	331		331

数値下の括弧内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査