

表 281 2014年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(和歌山県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	53	41	94		94
(%)	(37.9)	(49.4)	(42.2)		(42.2)
脳血管障害	7	3	10		10
(%)	(5.0)	(3.6)	(4.5)		(4.5)
感染症	20	6	26		26
(%)	(14.3)	(7.2)	(11.7)		(11.7)
消化管出血	1		1		1
(%)	(0.7)		(0.4)		(0.4)
悪性腫瘍	15	4	19		19
(%)	(10.7)	(4.8)	(8.5)		(8.5)
悪液質/尿毒症	5	1	6		6
(%)	(3.6)	(1.2)	(2.7)		(2.7)
心筋梗塞	6	5	11		11
(%)	(4.3)	(6.0)	(4.9)		(4.9)
カリウム中毒/頓死	7	2	9		9
(%)	(5.0)	(2.4)	(4.0)		(4.0)
肝硬変症	1	1	2		2
(%)	(0.7)	(1.2)	(0.9)		(0.9)
自殺/拒否		1	1		1
(%)		(1.2)	(0.4)		(0.4)
腸閉塞	2	2	4		4
(%)	(1.4)	(2.4)	(1.8)		(1.8)
肺血栓/肺塞栓					
(%)					
災害・事故死	1		1		1
(%)	(0.7)		(0.4)		(0.4)
その他	8	12	20		20
(%)	(5.7)	(14.5)	(9.0)		(9.0)
不明	14	5	19		19
(%)	(10.0)	(6.0)	(8.5)		(8.5)
合計	140	83	223		223
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	140	83	223		223

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査