

表 284 2014年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(岡山県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	66	36	102		102
(%)	(22.3)	(22.9)	(22.5)		(22.5)
脳血管障害	18	6	24		24
(%)	(6.1)	(3.8)	(5.3)		(5.3)
感染症	88	37	125		125
(%)	(29.7)	(23.6)	(27.6)		(27.6)
消化管出血	7	2	9		9
(%)	(2.4)	(1.3)	(2.0)		(2.0)
悪性腫瘍	33	13	46		46
(%)	(11.1)	(8.3)	(10.2)		(10.2)
悪液質/尿毒症	11	10	21		21
(%)	(3.7)	(6.4)	(4.6)		(4.6)
心筋梗塞	12	9	21		21
(%)	(4.1)	(5.7)	(4.6)		(4.6)
カリウム中毒/頓死	8	3	11		11
(%)	(2.7)	(1.9)	(2.4)		(2.4)
肝硬変症	1	1	2		2
(%)	(0.3)	(0.6)	(0.4)		(0.4)
自殺/拒否		1	1		1
(%)		(0.6)	(0.2)		(0.2)
腸閉塞	4		4		4
(%)	(1.4)		(0.9)		(0.9)
肺血栓/肺塞栓					
(%)					
災害・事故死	2		2		2
(%)	(0.7)		(0.4)		(0.4)
その他	30	26	56		56
(%)	(10.1)	(16.6)	(12.4)		(12.4)
不明	16	13	29		29
(%)	(5.4)	(8.3)	(6.4)		(6.4)
合計	296	157	453		453
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	296	157	453		453

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査