

表 285 2014年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(広島県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	120	80	200		200
(%)	(26.9)	(27.2)	(27.0)		(27.0)
脳血管障害	39	20	59		59
(%)	(8.7)	(6.8)	(8.0)		(8.0)
感染症	92	62	154		154
(%)	(20.6)	(21.1)	(20.8)		(20.8)
消化管出血	7	7	14		14
(%)	(1.6)	(2.4)	(1.9)		(1.9)
悪性腫瘍	52	27	79		79
(%)	(11.7)	(9.2)	(10.7)		(10.7)
悪液質/尿毒症	17	12	29		29
(%)	(3.8)	(4.1)	(3.9)		(3.9)
心筋梗塞	16	19	35		35
(%)	(3.6)	(6.5)	(4.7)		(4.7)
カリウム中毒/頓死	9	4	13		13
(%)	(2.0)	(1.4)	(1.8)		(1.8)
肝硬変症	5	2	7		7
(%)	(1.1)	(0.7)	(0.9)		(0.9)
自殺/拒否	5	2	7		7
(%)	(1.1)	(0.7)	(0.9)		(0.9)
腸閉塞	3	5	8		8
(%)	(0.7)	(1.7)	(1.1)		(1.1)
肺血栓/肺塞栓	1	1	2		2
(%)	(0.2)	(0.3)	(0.3)		(0.3)
災害・事故死	2	2	4		4
(%)	(0.4)	(0.7)	(0.5)		(0.5)
その他	47	32	79		79
(%)	(10.5)	(10.9)	(10.7)		(10.7)
不明	31	19	50		50
(%)	(7.0)	(6.5)	(6.8)		(6.8)
合計	446	294	740		740
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	446	294	740		740

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査