

表 286 2014年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(山口県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	58 (%) (22.7)	48 (%) (33.6)	106 (%) (26.6)		106 (%) (26.6)
脳血管障害	23 (%) (9.0)	9 (%) (6.3)	32 (%) (8.0)		32 (%) (8.0)
感染症	60 (%) (23.5)	30 (%) (21.0)	90 (%) (22.6)		90 (%) (22.6)
消化管出血	2 (%) (0.8)	4 (%) (2.8)	6 (%) (1.5)		6 (%) (1.5)
悪性腫瘍	27 (%) (10.6)	11 (%) (7.7)	38 (%) (9.5)		38 (%) (9.5)
悪液質/尿毒症	13 (%) (5.1)	4 (%) (2.8)	17 (%) (4.3)		17 (%) (4.3)
心筋梗塞	9 (%) (3.5)	7 (%) (4.9)	16 (%) (4.0)		16 (%) (4.0)
カリウム中毒/頓死	5 (%) (2.0)		5 (%) (1.3)		5 (%) (1.3)
肝硬変症	3 (%) (1.2)	2 (%) (1.4)	5 (%) (1.3)		5 (%) (1.3)
自殺/拒否	2 (%) (0.8)		2 (%) (0.5)		2 (%) (0.5)
腸閉塞	6 (%) (2.4)	3 (%) (2.1)	9 (%) (2.3)		9 (%) (2.3)
肺血栓/肺塞栓	1 (%) (0.4)		1 (%) (0.3)		1 (%) (0.3)
災害・事故死	1 (%) (0.4)		1 (%) (0.3)		1 (%) (0.3)
その他	16 (%) (6.3)	14 (%) (9.8)	30 (%) (7.5)		30 (%) (7.5)
不明	29 (%) (11.4)	11 (%) (7.7)	40 (%) (10.1)		40 (%) (10.1)
合計	255 (%) (100.0)	143 (%) (100.0)	398 (%) (100.0)		398 (%) (100.0)
記載なし					
総計	255	143	398		398

数値下の括弧内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査