

表 287 2014年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(徳島県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	38 (%) (25.0)	35 (%) (31.3)	73 (%) (27.7)		73 (%) (27.7)
脳血管障害	9 (%) (5.9)	6 (%) (5.4)	15 (%) (5.7)		15 (%) (5.7)
感染症	41 (%) (27.0)	28 (%) (25.0)	69 (%) (26.1)		69 (%) (26.1)
消化管出血	2 (%) (1.3)		2 (%) (0.8)		2 (%) (0.8)
悪性腫瘍	14 (%) (9.2)	7 (%) (6.3)	21 (%) (8.0)		21 (%) (8.0)
悪液質/尿毒症	3 (%) (2.0)	8 (%) (7.1)	11 (%) (4.2)		11 (%) (4.2)
心筋梗塞	6 (%) (3.9)	3 (%) (2.7)	9 (%) (3.4)		9 (%) (3.4)
カリウム中毒/頓死	5 (%) (3.3)	4 (%) (3.6)	9 (%) (3.4)		9 (%) (3.4)
肝硬変症	3 (%) (2.0)	1 (%) (0.9)	4 (%) (1.5)		4 (%) (1.5)
自殺/拒否	1 (%) (0.7)		1 (%) (0.4)		1 (%) (0.4)
腸閉塞	3 (%) (2.0)	1 (%) (0.9)	4 (%) (1.5)		4 (%) (1.5)
肺血栓/肺塞栓	1 (%) (0.7)		1 (%) (0.4)		1 (%) (0.4)
災害・事故死	3 (%) (2.0)	3 (%) (2.7)	6 (%) (2.3)		6 (%) (2.3)
その他	18 (%) (11.8)	13 (%) (11.6)	31 (%) (11.7)		31 (%) (11.7)
不明	5 (%) (3.3)	3 (%) (2.7)	8 (%) (3.0)		8 (%) (3.0)
合計	152 (%) (100.0)	112 (%) (100.0)	264 (%) (100.0)		264 (%) (100.0)
記載なし					
総計	152	112	264		264

数値下の括弧内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査