

表 288 2014年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(香川県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	52	42	94		94
(%)	(31.7)	(42.9)	(35.9)		(35.9)
脳血管障害	10	9	19		19
(%)	(6.1)	(9.2)	(7.3)		(7.3)
感染症	47	17	64		64
(%)	(28.7)	(17.3)	(24.4)		(24.4)
消化管出血	3	1	4		4
(%)	(1.8)	(1.0)	(1.5)		(1.5)
悪性腫瘍	10	4	14		14
(%)	(6.1)	(4.1)	(5.3)		(5.3)
悪液質/尿毒症	7	5	12		12
(%)	(4.3)	(5.1)	(4.6)		(4.6)
心筋梗塞	7	2	9		9
(%)	(4.3)	(2.0)	(3.4)		(3.4)
カリウム中毒/頓死	4	1	5		5
(%)	(2.4)	(1.0)	(1.9)		(1.9)
肝硬変症	6		6		6
(%)	(3.7)		(2.3)		(2.3)
自殺/拒否	1		1		1
(%)	(0.6)		(0.4)		(0.4)
腸閉塞	2	1	3		3
(%)	(1.2)	(1.0)	(1.1)		(1.1)
肺血栓/肺塞栓					
(%)					
災害・事故死	2		2		2
(%)	(1.2)		(0.8)		(0.8)
その他	7	10	17		17
(%)	(4.3)	(10.2)	(6.5)		(6.5)
不明	6	6	12		12
(%)	(3.7)	(6.1)	(4.6)		(4.6)
合計	164	98	262		262
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	164	98	262		262

数値下の括弧内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査