

表 289 2014年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(愛媛県)

| 死因 | 男性 | 女性 | 合計 | 記載なし | 総計 |
|-----------|---------|---------|---------|------|---------|
| 心不全 | 49 | 44 | 93 | | 93 |
| (%) | (22.7) | (33.3) | (26.7) | | (26.7) |
| 脳血管障害 | 21 | 10 | 31 | | 31 |
| (%) | (9.7) | (7.6) | (8.9) | | (8.9) |
| 感染症 | 41 | 25 | 66 | | 66 |
| (%) | (19.0) | (18.9) | (19.0) | | (19.0) |
| 消化管出血 | 2 | 2 | 4 | | 4 |
| (%) | (0.9) | (1.5) | (1.1) | | (1.1) |
| 悪性腫瘍 | 24 | 7 | 31 | | 31 |
| (%) | (11.1) | (5.3) | (8.9) | | (8.9) |
| 悪液質/尿毒症 | 9 | 6 | 15 | | 15 |
| (%) | (4.2) | (4.5) | (4.3) | | (4.3) |
| 心筋梗塞 | 10 | 4 | 14 | | 14 |
| (%) | (4.6) | (3.0) | (4.0) | | (4.0) |
| カリウム中毒/頓死 | 7 | 3 | 10 | | 10 |
| (%) | (3.2) | (2.3) | (2.9) | | (2.9) |
| 肝硬変症 | 1 | 1 | 2 | | 2 |
| (%) | (0.5) | (0.8) | (0.6) | | (0.6) |
| 自殺/拒否 | 3 | 1 | 4 | | 4 |
| (%) | (1.4) | (0.8) | (1.1) | | (1.1) |
| 腸閉塞 | 2 | 2 | 4 | | 4 |
| (%) | (0.9) | (1.5) | (1.1) | | (1.1) |
| 肺血栓/肺塞栓 | | | | | |
| (%) | | | | | |
| 災害・事故死 | | 3 | 3 | | 3 |
| (%) | | (2.3) | (0.9) | | (0.9) |
| その他 | 18 | 15 | 33 | | 33 |
| (%) | (8.3) | (11.4) | (9.5) | | (9.5) |
| 不明 | 29 | 9 | 38 | | 38 |
| (%) | (13.4) | (6.8) | (10.9) | | (10.9) |
| 合計 | 216 | 132 | 348 | | 348 |
| (%) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | | (100.0) |
| 記載なし | | | | | |
| 総計 | 216 | 132 | 348 | | 348 |

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査