

表 290 2014年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(高知県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	42 (%) (29.0)	34 (39.5)	76 (32.9)		76 (32.9)
脳血管障害	11 (%) (7.6)	9 (10.5)	20 (8.7)		20 (8.7)
感染症	23 (%) (15.9)	14 (16.3)	37 (16.0)		37 (16.0)
消化管出血	3 (%) (2.1)		3 (1.3)		3 (1.3)
悪性腫瘍	16 (%) (11.0)	7 (8.1)	23 (10.0)		23 (10.0)
悪液質/尿毒症	4 (%) (2.8)	4 (4.7)	8 (3.5)		8 (3.5)
心筋梗塞	10 (%) (6.9)	6 (7.0)	16 (6.9)		16 (6.9)
カリウム中毒/頓死	4 (%) (2.8)		4 (1.7)		4 (1.7)
肝硬変症	2 (%) (1.4)		2 (0.9)		2 (0.9)
自殺/拒否	2 (%) (1.4)		2 (0.9)		2 (0.9)
腸閉塞	1 (%) (0.7)	4 (4.7)	5 (2.2)		5 (2.2)
肺血栓/肺塞栓	1 (%) (0.7)		1 (0.4)		1 (0.4)
災害・事故死	1 (%) (0.7)		1 (0.4)		1 (0.4)
その他	11 (%) (7.6)	6 (7.0)	17 (7.4)		17 (7.4)
不明	14 (%) (9.7)	2 (2.3)	16 (6.9)		16 (6.9)
合計	145 (%) (100.0)	86 (100.0)	231 (100.0)		231 (100.0)
記載なし					
総計	145	86	231		231

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査